

កម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំង

➢ ចាក់ថ្នាំការពារសំរាប់កូនជ្រូក

អាយុ	ប្រភេទវ៉ាក់សាំង	ការពារជំងឺ	របៀបប្រើ	កំរិតនៃការប្រើប្រាស់
១ថ្ងៃ	Porcine Coli	រាគកូនជ្រូក	ផឹក	២ cc, ១ក្បាល
២ថ្ងៃ	Enro 100	សំលាប់បាក់តេរី	ចាក់	០,២ cc, ១ក្បាល
-	Enro 100	សំលាប់បាក់តេរី	ផឹក	០,២ cc, ១ក្បាល
៣ថ្ងៃ	Vitamin AD₃E	ជំនួយកំលាំង	ចាក់ IM	០,៣ cc, ១ក្បាល
-	Fer Genty	ខ្លះជាតិដែក	ចាក់ IM	១ cc, ១ក្បាល
-	Fer B₁₂	ខ្លះជាតិដែក	ចាក់ IM	១ cc, ១ក្បាល
៧ថ្ងៃ	Rhini TX4	សារទឹក កញ្ជ្រូល រលាកទងស្នូតលើកទី១	ចាក់ IM	១ cc, ១ក្បាល
១៨ថ្ងៃ	Salmonella	ការពារជំងឺត្រូវពោះវៀនលើកទី១	ចាក់ IM	១ cc, ១ក្បាល
២២ថ្ងៃ	Rhini TX4	សារទឹក កញ្ជ្រូល រលាកទងស្នូតលើកទី២	ចាក់ IM	២ cc, ១ក្បាល
៣៣ថ្ងៃ	Ivomectin	ទំលាក់ព្រូន និងអង្កែ	ចាក់ SC	១ cc, ១ក្បាល
៣៥ថ្ងៃ	Salmonella	ការពារជំងឺត្រូវពោះវៀនលើកទី២	ចាក់ IM	២ cc, ១ក្បាល
៤០ថ្ងៃ	Pest Vaccine	ការពារជំងឺ ប៉េស្តលើកទី១	ចាក់ IM	២ cc, ១ក្បាល
៤៥ថ្ងៃ	Survaxin	ការពារជំងឺអ្នត និង អូហ្សេស្ត្រីលើកទី១	ចាក់ IM	២ cc, ១ក្បាល
៦០ថ្ងៃ	Pest Vaccine	ការពារជំងឺ ប៉េស្តលើកទី២	ចាក់ IM	២ cc, ១ក្បាល
៧០ថ្ងៃ	F.M.D	ការពារជំងឺអុតក្តាម	ចាក់ IM	២ cc, ១ក្បាល

➤ វ៉ាក់សាំងសំរាប់បក្សី

-សំរាប់មាន់យកស៊ុត

ល.រ	សប្តាហ៍ចិញ្ចឹម	ប្រភេទវ៉ាក់សាំង	ការពារជំងឺ	របៀបប្រើ
១	១	ND+IB	ញូវកាស	ផឹក រឺ បន្តក់ភ្នែក
២	២	Gumboro	គូមបូរី	ផឹក រឺ បន្តក់ភ្នែក
៣	៣	Fowl Pox	អុត	ចាក់ក្រោមស្បែករឺ ជួសស្លាប
៤	៥	ផ្តាសសាយ	ផ្លូវដង្ហើម	ចាក់សាច់ដុំ ០,៣មល
៥	៨	ND+IB	ញូវកាស	ផឹក រឺ បន្តក់ភ្នែក
៦	១០	សរសៃប្រសាទ		ផឹក រឺ បន្តក់
៧	១៣	Coryza	កូរីសា	ចាក់សាច់ដុំ
៨	១៦	ND+IB+EDS ជំនួយស៊ុត		ចាក់សាច់ដុំ

-សំរាប់មាន់យកសាច់

ល.រ	សប្តាហ៍ចិញ្ចឹម	ប្រភេទវ៉ាក់សាំង	ការពារជំងឺ	របៀបប្រើ
១	១	ND+IB	ញូវកាស	ផឹក រឺ បន្តក់ភ្នែក
២	២	Gumboro	គូមបូរី	ផឹក រឺ បន្តក់ភ្នែក
៣	៤	Coryza	កូរីសា	ចាក់សាច់ដុំ
៤	៨	ND	ញូវកាស	ផឹក

-វ៉ាក់សាំងសំរាប់ទា

ល.រ	ពេលអាយុបាន	ប្រភេទវ៉ាក់សាំង	ការពារជំងឺ	របៀបប្រើ
១	៣ថ្ងៃ	Pest	ប៉េស្ត	ចាក់សើរស្បែករឺ បន្តក់ច្រមុះ
២	១៥ថ្ងៃ	សារទឹក	សារទឹក	ចាក់សើរស្បែករឺ សាច់ដុំ
៣	២១ថ្ងៃ	Pest	ប៉េស្ត	ចាក់សើរស្បែករឺ បន្តក់ច្រមុះ
៤	៤៥ថ្ងៃ	Cholera	អាសន្នរោគ	ចាក់សើរស្បែករឺ សាច់ដុំ

➤ វ៉ាក់សាំងសំរាប់គោ-ក្របី

ល.រ	អាយុ	ប្រភេទវ៉ាក់សាំង	ការពារជំងឺ	របៀបប្រើ (SC)
១	១ខែក្រោយផ្តាច់ដោះ	F.M.D.	អុតក្តាម	១ cc/ ក្បាល
២	៤ ខែ	Anthrax (ហាមចាក់មេដើម)	ឈាមខ្មៅ	១ cc/ ក្បាល
៣	៦ ខែ	Pasteurellosis.	សារទឹក	១,៥ cc/ ក្បាល
៤	លើសពី ៦ ខែ	Rinder Pest.	អាសន្នរោគ	១-២ cc/ ក្បាល
៥	១២ខែ	Pasteurellosis (អាចចាក់លើមេដើម ៤-៨ខែ បាន)	សារទឹក	២ cc/ ក្បាល