

**វិធានការការពារ:**

- ត្រូវប្រញាប់វាយការណ៍ជូនមន្ត្រីបសុពន្យ ឬ ភ្នាក់ងារសុខភាពសត្វភូមិដែលនៅជិតអ្នកប៉ុគ នៅពេលសត្វមានរង្វង់ដងអុតក្តាម
  - ត្រូវបំបែកសត្វឈឺចេញពីប្លង
  - ត្រូវធ្វើអនាម័យកន្លែងចិញ្ចឹមជាប្រចាំ
  - ត្រូវផ្តល់ថ្នាំអាហារទន្ទ
  - ត្រូវលាងសំអាតបួសដោយទឹកម្អូរ
  - ហាមចលនាសត្វចេញ-ចូល ឬ ឆ្លងកាត់តំបន់នេះដង
  - ហាមទិញ-លក់សត្វគ្រប់ប្រភេទ ដែលមានជងី ឬផ្ទុកមេរោគ
- វិធានការដែលមានប្រសិទ្ធភាព ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជងីអុតក្តាមគឺ ការចាក់ថ្នាំការពារ (ចាក់វ៉ាក់សាំង) ជាមុន ។ ការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជាមុន មិនត្រឹមតែអាចការពារសត្វមិនឱ្យកើតជងីអុតក្តាមប៉ុណ្ណោះទេ តែថែមទាំងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀតដូចជា:
- សត្វមិនឈឺ និង មិនរងរងជំងឺពីសត្វដទៃទោះបីសត្វនោះស្ថិតនៅកន្លែងផ្ទះដងក្តី
  - សត្វគ្មានជងី និង មានសុខភាពល្អ

- ថ្នាំការពារ (វ៉ាក់សាំង) មានតម្លៃថោក
  - កាត់បន្ថយការចំណាយថវិកាក្នុងការព្យាបាល
  - បង្កើនប្រាក់ចំណូល
- ដូចនេះ ដើម្បីការពារសត្វកុំឱ្យកើតជងីអុតក្តាម ត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងការពារសត្វឱ្យបានឡើងទាត់តាមប្រតិទិនចាក់ថ្នាំការពារ ។
- វ៉ាក់សាំងការពារជងីអុតក្តាម ផ្តល់ភាពស្ងប់ដែលអាចស្នេរបាន ក្នុងរយៈពេល ១០-១២ ខែ ។



**ថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារជងីអុតក្តាម**

**កំណត់ចំណាំ:**

ចាក់វ៉ាក់សាំងមួយមុខ គឺអាចការពារឯងបានតែមួយមុខប៉ុណ្ណោះ។

**ការការពារប្រូមេសេវ៉ាខាងការព្យាបាល**



**នាយកដ្ឋានជំងឺសត្វ និងមនុស្សធាន**



**អនុប្រយោជន៍នៃការចាក់ថ្នាំការពារជងីអុតក្តាម**

*Foot and Mouth Disease*



**ព័ត៌មានបន្ថែម:** : នាយកដ្ឋានជំងឺសត្វ និង មនុស្សធាន  
**អាសយដ្ឋាន :** : ផ្លូវ សឡា ភូមិទ្រា សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ  
 ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ  
**ទូរស័ព្ទចុះទូរស័ព្ទ :** : ០១២ ២១៩ ៩៧០  
**០១២ ៨៣៣ ៧៩៥**

**សេដ្ឋកិច្ចសត្វផ្សេងៗ ១**

ជំងឺអុតក្តាម ជាជំងឺឆ្លងដែលកើតមានលើចំពោះសត្វដែល មានចង្កែកជើងពីរដូចជា: គោ ក្របី ជ្រូកពពែ ថ្ងៃម.....។

ជំងឺនេះមានកើតឡើងនៅ ពេលពេញពិភពលោក ធ្វើឱ្យមាន ផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់កម្លាំងអ្នកសមាញ់ សេដ្ឋកិច្ច គ្រួសារ និង សេដ្ឋកិច្ចជាតិ ។

**ការបង្ក និងការពារជំងឺ:**

ជំងឺអុតក្តាម ឆ្លងពីសត្វមួយ ទៅសត្វមួយទៀត តាមរយៈ

ការប៉ះពាល់ជាមួយសត្វឈឺ មនុស្ស ឬ សម្ភារៈ ប្រើប្រាស់ ដែលប្រឡាក់ប្រឡូសដោយមេរោគ ។ មេរោគនៃជំងឺ អុតក្តាម អាចរើរតាមខ្យល់ និង ហូរតាមទឹក ។ ជំងឺអាច កើតឡើងតាមរយៈ:

- ការប្រើប្រាស់ខោអាវ ស្បែកជើង ឬ សម្ភារៈប្រើប្រាស់ ដែលប្រឡាក់ប្រឡូសមេរោគទៅប៉ះពាល់ជាមួយនិងសត្វ
- ការផ្តល់បំណី និង ទឹកដែលប្រឡាក់ប្រឡូសមេរោគ
- ការដឹកនាំសត្វ ដោយមធ្យោយដឹកជញ្ជូន ដែលប្រឡាក់ ប្រឡូសមេរោគ
- ការនាំសត្វដែលមានផ្ទុកមេរោគចូលមកក្នុងហ្វូង
- ការដាក់សត្វនៅកន្លែងដែលមានផ្ទុកជំងឺ ។

**រោគសញ្ញា:**

រយៈពេលមេរោគសម្លាប់បានពី ១៨ ម៉ោងទៅ ០៣ សប្តាហ៍ ។

រោគសញ្ញាដែលឃើញមាននៅពេលផ្តុំជំងឺរួមមាន:

- សត្វមានអាការៈគ្រុនក្តៅ ជាពិសេសចំពោះសត្វដទៃៗ
- ស័ក្តិសម្បទាថយចុះមកវិញនៅ ៤៨ ម៉ោងក្រោយ
- ពងដោរ និង ដំរៅនៅលើមាត់ អណ្តាត បបូរមាត់ បណ្តាចខ្សែ មានការហៀរទឹកមាត់ស្អិតអន្ទាយ មានបែកពុះមាត់ មាន ហៀរទឹកមាត់យ៉ាងច្រើន និង ពិបាកស្តីចំណី ។



- ពងដោរ និងដំរៅនៅច្រុងដោះ ចន្លោះចង្កែកជើង និង គល់ក្រចក ដែលធ្វើឱ្យសត្វពិបាកឈរ និងធ្វើចលនា

- ពងបែកហៀរទឹករង្វា ឬខាប់ និង បន្សល់នូវស្នាម រូបសនៅកន្លែង មានពងបែកនោះ

- ការរលូតកូនកើតមានជាញឹកញាប់

- ជំងឺអុតក្តាមកម្របណ្តាចខ្សែសត្វស្លាប់ណាស់ ប៉ុន្តែការផ្តាត់ ឡើងវិញក្រោយពីសត្វឈឺមានការយឺតយ៉ាវ

- ការស្តាប់អាចកើតមានចំពោះកូនសត្វ ដែលទើបនឹងកើត និង ជួនកាលក៏អាចកើតមានដល់សត្វចាស់ផងដែរ ។

