

# ការចិញ្ចឹមទា តាមបច្ចេកទេសបែបវិទ្យាសាស្ត្រធម្មជាតិ

## ១- ការជ្រើសរើសពូជ

- 1 – ជាទាជំនាន់ អ៊ី អ៊ីកូ អ៊ីម ដែលបង្កើតឡើងដោយការគ្លាស់ចេញពីពងទា អ៊ី អ៊ីកូ អ៊ីម ។
- 2 – ជ្រើសរើសយកកូនទាដែលមានឆ្អឹងរឹងមាំ ។
- 3 – ដងខ្លួនមានរាងជាចតុកោណស្មើ ។
- 4 – ឆ្អឹងគុម្ពកន្ទុយនូវគូថត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាចំពោះទាមេ ចំណែកឯទាបារីញត្រូវឆ្អឹងនៅជិតគ្នា ។

## ២- ការសង់ទ្រុងទា

- 1- ការសង់ទ្រុងទាត្រូវធ្វើឡើងនៅតាមបណ្តោយថ្ងៃ ។ បណ្តោយទ្រុង ១០ម៉ែត្រ និងទទឹង ៤ម៉ែត្រ ។ តំរូវចំនួន ២៥០ ទៅ ៥០០ក្បាល ។ ការធ្វើទ្រុងបែបនេះជាការចិញ្ចឹមតាមលក្ខណៈគ្រួសារ ។
- 2- ជុំវិញទ្រុងដែលសង់គួរតែយកស្បែកនីឡុងព័ទ្ធជុំវិញ ឬយកសំណាញ់ដែកព័ទ្ធជុំវិញឬយកសំណាញ់ដែកព័ទ្ធជា ការប្រសើរ ដើម្បីការពារសត្វផ្សេងៗមកយាយីជីវិតសត្វទា និង ការចំលងមេរោគ ។
- 3- ចំពោះដំបូលទ្រុង គួរតែប្រក់ស្លឹកធ្វើពីស្បូវ ជៀសវាងយកដែកមកប្រក់ ជាហេតុបណ្តាលអោយឡើងកំដៅនៅពេល រដូវក្តៅ ។
- 4- កំពស់រោងទា ប្រមាណ ១.៥ម៉ែត្រ ទៅ ២ម៉ែត្រ ។
- 5- នៅក្នុងទ្រុងទាត្រូវក្រាលអង្កាមរស់ ឬមិនបាច់ក៏បានដែរ បើក្រាលវាចំណេញការធ្វើជីអង្កាមរស់ដើម្បីយកទៅដាក់ស្រែ ។

## ៣- ការថែទាំកូនទា

- 1- កូនទាដែលញាស់បាន ១សប្តាហ៍ហើយ ត្រូវយកមេ អ៊ី អ៊ីកូ អ៊ីម បញ្ជូកក្នុង ១ក្បាល ១សេសេ ។
- 2- បើអាកាសធាតុប្រែប្រួលត្រជាក់ខ្លាំង យើងត្រូវយកក្របមកចងព្យួរ ដុតឆ្ងួងដើម្បីរក្សាសីតុណ្ហភាព បើសិនជាស្ថិតនៅក្នុង រដូវប្រាំងវិញ លើផ្ទៃដែលកូនទារស់នៅមិនចាំបាច់ក្រាលអង្កាមទេ ។
- 3- យកមេ អ៊ី អ៊ីកូ អ៊ីម ១លីត្រ លាយជាមួយទឹកស្អាត ១០០០០លីត្រ អោយកូនទាផឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃ ( ទឹកស្អាត ១០ លីត្រ លាយមេអ៊ី អ៊ីកូ អ៊ីម ១សេសេ ) ។ ទឹកដែលលាយនេះមិន អាចទុកលើសពី ២៤ម៉ោងទេ បើទាផឹកមិនអស់ត្រូវជះ ទៅលើកន្លែងដែលមានក្លិនស្អុយហើយយើងចាប់ លាយសារជាថ្មីដោយអនុវត្តតាមរបៀបនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃ បើសិនជា មានជំងឺក៏ ងាយស្រួលនឹងព្យាបាលដែរ ។
- 4- ឧស្សាហ៍ព្យាយាមសង្កេតមើលដំណើរសកម្មភាពទាទាំងឡាយនោះ បើទាណាមានការប្រែប្រួល ត្រូវចាប់មកបញ្ជូកមេ អ៊ី អ៊ីកូ អ៊ីម ចាប់ពី ១-៣សេសេ ចំពោះទា ១ក្បាល ហើយទុកមួយកន្លែងសិន ។ បើសិនជាសះស្បើយហើយទើបយើង បញ្ចូលក្នុងហ្វូងវិញ តែបើសិនជានៅមានបញ្ហាទៀតសូមទំនាក់ទំនងមកក្រុមហ៊ុនដើម្បីយកថ្នាំ បសុសត្វទៅព្យាបាល ។
- 5- យកម្សៅស៊ីរិទ្ធ ១កញ្ចប់តូច លាយជាមួយចំណីមាន ៥គីឡូក្រាម ក្នុងមួយសប្តាហ៍ អោយមានស៊ី ១ ឬ២ដង
- 6- យកម្សៅស៊ីរិទ្ធ ១កញ្ចប់តូច លាយជាមួយទឹកស្អាត ៥លីត្រ អោយមានផឹកមួយសប្តាហ៍ ២ដង ។
- 7- នៅជុំវិញបរិវេណ ដែលទាតែងតែរស់នៅ ( ទ្រុង មាត់ស្រះទឹក ទឹកស្រះ ) គួរតែបាញ់ អ៊ី អ៊ីកូ អ៊ីមបំផ្លាញបាក់តេរីអាក្រក់ ក្នុង១សប្តាហ៍ ១ ទៅ ២ដង ទោះជាត្រូវកូនទា ទាធំក៏ មិនអីដែរ ( ១:២៥០ ) ។ ការធ្វើបែបនេះបរិស្ថានរស់នៅរបស់ទា ទារៀសផុតពីជំងឺផ្សេងៗ បើចង់បានផលការចិញ្ចឹមត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ ។

**៤- ករណីទាមានជំងឺ**

- 1- ជំងឺទាទន់ជើង គេហៅថា ទាប៉ាប យើងប្រើមេ អី អីក្ស អិម បញ្ចក្ខណ៍ ១ក្បាល ៣សេសេ ក្នុង១ថ្ងៃ៣ដង បើមិនបាត់ត្រូវ បញ្ចក្ខណ៍ អី អីក្ស អិម ១-២សេសេ លាយជាមួយបណ្តាញ ពណ៌ខៀវ របស់ក្រុមហ៊ុន ១-២សេសេ ។ បើនៅតែមិនជា សូម ប្រើថ្នាំបសុសត្វរបស់ក្រុមហ៊ុន ឈ្មោះអាមុក រឺទំនាក់ទំនងមកអ្នកជំនាញរបស់ក្រុមហ៊ុន ។
- 2- ជំងឺក្រហមភ្នែក សូមប្រើម្សៅសំរិទ្ធលាយជាមួយមេ អី អីក្ស អិម នឹងចំណីអាហារអោយទាស៊ី ។
- 3- ក្នុងករណីមានជំងឺផ្សេងៗទៀតលើសពីនេះ ឬប្រើប្រាស់ទៅមិនមានប្រសិទ្ធិភាព សូមទំនាក់ទំនងមកក្រុមការងាររបស់ យើងខ្ញុំ ( ០២៣ ៨៨ ២៥ ៥៥ ) ។

**ដកស្រងចេញពី៖**

<http://sopheapprom.wordpress.com/2011/10/08/%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%85%E1%9E%B7%E1%9E%89%E1%9F%92%E1%9E%85%E1%9E%B9%E1%9E%98%E2%80%8B%E1%9E%91%E1%9E%B6%E2%80%8B-%E2%80%8B%E1%9E%8F%E1%9E%B6%E1%9E%98%E2%80%8B%E1%9E%94%E1%9E%85%E1%9F%92/>