

ការចិញ្ចឹមទា តាមបច្ចេកទេសបែបវិទ្យាសាស្ត្រធម្មជាតិ

១- ការជ្រើសរើសពូជ

- ជាទាជំនាន់ អ៊ុ អ៊ុក្ស អិម ដែលបង្កើតឡើងដោយការភ្ជាស់ចេញពីពងទា អ៊ុ អ៊ុក្ស អិម ។
- ជ្រើសរើសយកកូនទាដែលមានឆ្អឹងរឹងមាំ ។
- ដងខ្លួនមានរាងជាចតុកោណស្មើ ។
- ឆ្អឹងគុម្ពកន្ទុយរន្ធក្នុងត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាចំពោះទាមេ ចំណែកឯទាបារិញត្រូវឆ្អឹងនៅជិតគ្នា ។

២- ការសង់ទ្រុងទា

- ការសង់ទ្រុងទាត្រូវធ្វើឡើងនៅតាមបណ្តោយថ្ងៃ ។ បណ្តោយទ្រុង ១០ម៉ែត្រ និងទទឹង ៤ ម៉ែត្រ ។ តំរូវចំនួន ២៥០ ទៅ ៥០០ក្បាល ។ ការធ្វើទ្រុងបែបនេះជាការចិញ្ចឹមតាមលក្ខណៈគ្រួសារ ។
- ជុំវិញទ្រុងដែលសង់គួរតែយកស្បែកឡើងជុំវិញ ឬយកសំណាញ់ដែកជុំវិញឬយកសំណាញ់ដែកជុំវិញជាការប្រសើរ ដើម្បីការពារសត្វផ្សេងៗមកយាយីជីវិតសត្វទា និងការចំលងមេរោគ ។
- ចំពោះដំបូលទ្រុង គួរតែប្រក់ស្លឹកធ្វើពីស្បូវ ជៀសវាងយកដែកមកប្រក់ ជាហេតុបណ្តាលអោយឡើងកំដៅនៅពេលរដូវក្តៅ ។
- កំពស់រោងទា ប្រមាណ ១.៥ម៉ែត្រ ទៅ ២ម៉ែត្រ ។
- នៅក្នុងទ្រុងទាត្រូវក្រាលអង្កាមរស់ ឬមិនបាច់ក៏បានដែរ បើក្រាលវាចំណេញការធ្វើដីអង្កាមរស់ដើម្បីយកទៅដាក់ស្រែ ។

៣- ការថែទាំកូនទា

- កូនទាដែលញាស់បាន ១សប្តាហ៍ហើយ ត្រូវយកមេ អ៊ុ អ៊ុក្ស អិម បញ្ជាក់ក្នុង ១ក្បាល ១សេស ។

- បើអាសាសនាគុប្រែប្រួលត្រជាក់ខ្លាំង យើងត្រូវយកក្នុងមកចងព្យួរ ដុតធូលីដើម្បីរក្សា សីតុណ្ហភាព បើសិនជាស្ថិតនៅក្នុងរដូវប្រាំងវិញ លើផ្ទៃដែលកូនទារសនៅមិនចាំបាច់ក្រាល អង្កាមទេ ។
- យកមេ អ៊ី អ៊ីក្ស អិម ១លីត្រ លាយជាមួយទឹកស្អាត ១០០០០លីត្រ អោយកូនទាជីកជា រៀងរាល់ថ្ងៃ (ទឹកស្អាត ១០លីត្រ លាយមេអ៊ី អ៊ីក្ស អិម ១សេសេ) ។ ទឹកដែលលាយនេះមិន អាចទុកលើសពី ២៤ម៉ោងទេ បើទាជីកមិនអស់ត្រូវជះទៅលើកន្លែងដែលមាន ក្លិនស្អុយហើយយើងចាប់លាយសារជាថ្មីដោយអនុវត្តន៍តាមរបៀបនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃ បើសិនជាមានជំងឺក៏ ងាយស្រួលនឹងព្យាបាលដែរ ។
- ឧស្សាហ៍ព្យាយាមសង្កេតមើលដំណើរសកម្មភាពទាទាំងឡាយនោះ បើទាណាមាន ការប្រែប្រួល ត្រូវចាប់មកបញ្ជាក់មេ អ៊ី អ៊ីក្ស អិម ចាប់ពី ១-៣សេសេ ចំពោះទា ១ក្បាល ហើយទុកមួយកន្លែងសិន ។ បើសិនជាសះស្បើយហើយទើបយើងបញ្ជូលក្នុងហ្វូងវិញ តែ បើសិនជានៅមានបញ្ហាទៀតសូមទំនាក់ទំនងមកក្រុមហ៊ុនដើម្បីយកថ្នាំបសុសត្វទៅ ព្យាបាល ។
- យកម្សៅសំរិទ្ធ ១កញ្ចប់តូច លាយជាមួយចំណីមាន់ ៥គីឡូក្រាម ក្នុងមួយសប្តាហ៍ អោយមាន់ ស៊ី ១ ឬ២ដង
- យកម្សៅសំរិទ្ធ ១កញ្ចប់តូច លាយជាមួយទឹកស្អាត ៥លីត្រ អោយមាន់ផឹកមួយសប្តាហ៍ ២ ដង ។
- នៅជុំវិញបរិវេណ ដែលទាតែងតែរស់នៅ (ទ្រុង មាត់ស្រះទឹក ទឹកស្រះ) គួរតែបាញ់ អ៊ី អ៊ីក្ស អិមបំផ្លាញបាក់តេរីអាក្រក់ ក្នុង១សប្តាហ៍ ១ ទៅ ២ដង ទោះជាត្រូវកូនទា ទាជីក មិនអីដែរ (១:២៥០) ។ ការធ្វើបែបនេះបរិស្ថានរស់នៅរបស់ទា ទាជីកសុទ្ធតែជ័រជ័រ បើចង់បាន ផលការចិញ្ចឹមត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ ។

៤- ករណីទាមានជំងឺ

- ជំងឺទាទន់ជើង គេហៅថា ទាប៉ាប យើងប្រើមេ អ៊ី អ៊ីក្ស អិម បញ្ជាក់១ក្បាល ៣សេសេ ក្នុង១ ថ្ងៃ៣ដង បើមិនបាត់ត្រូវបញ្ជាក់មេ អ៊ី អ៊ីក្ស អិម ១-២សេសេ លាយជាមួយបណ្តាញ ពណ៌ ខៀវ របស់ក្រុមហ៊ុន ១-២សេសេ ។ បើនៅតែមិនជា សូមប្រើថ្នាំបសុសត្វរបស់ក្រុមហ៊ុន ឈ្មោះអាមុក រឺទំនាក់ទំនងមកអ្នកជំនាញរបស់ក្រុមហ៊ុន ។

- ជំងឺក្រហមភ្នែក សូមប្រើម្សៅសំរិទ្ធលាយជាមួយមេ អ៊ី អ៊ុក្ស អិម នឹងចំណីអាហារអោយទាស៊ី។
- ក្នុងករណីមានជំងឺផ្សេងៗទៀតលើសពីនេះ ឬប្រើប្រាស់ទៅមិនមានប្រសិទ្ធិភាព សូមទំនាក់ទំនងមកក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំ (០២៣ ៨៨ ២៥ ៥៥) ។

(ដកស្រង់ចេញពី ខេមបូឌាអេចប្រេសញ្ញស៍)