

ការចិញ្ចឹម (rearing)

គេត្រូវបញ្ឈប់ការឲ្យកំដៅ ក្រោយពីមានអាយុ៣សប្តាហ៍ ឬដើមរដូវដែលមានអាកាសធាតុក្តៅ។ អ្នកចិញ្ចឹមមានធ្វើការជ្រើសរើសប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងផ្សេងៗគ្នា ។ ហ្វូងមានអាចត្រូវបានចិញ្ចឹម ដោយឲ្យដើររកស៊ីដោយខ្លួនឯង នៅខាងក នៅកន្លែងដែលគេកំណត់ព្រំដែនដាក់ក្នុងទ្រុងធំ ក្នុងទ្រុងតូច រឺ យ៉ាងនៅក្នុងទ្រុងចិញ្ចឹមទាំងមូល ។

គុណសម្បត្តិនៃការចិញ្ចឹមលែង រួមមាន :

- បន្ថយការចំណាយលើចំណីអាហារ ដោយឲ្យបក្សីទាំងនោះអាចដើររកស៊ីបានដោយខ្លួនឯង ដូចជារុករានជាតិបៃតងស្រស់, សត្វល្អិត និងកាយស៊ីក្នុងលាមកសត្វពាហនៈធំៗ ។
- បន្ថយនូវចំណាយការសាងសង់ទ្រុង ។

គុណវិបត្តិរួមមាន :

- បាត់បង់ដោយសត្វចង្រៃស៊ី
- ជំងឺឆ្លងបានដោយងាយពីតំបន់ គង្វាលសត្វដទៃៗទៀត ។ ការចិញ្ចឹមលែងដោយមានកំណត់ព្រំដែន ត្រូវការការគ្រប់គ្រងហ្វូងសត្វតិចតួច ។

គុណសម្បត្តិនៃការចិញ្ចឹមដាក់ទ្រុងធំ គឺអាចការពារបានច្រើនពីធាតុអាកាស និងសត្វចង្រៃផ្សេងៗ ។ គុណវិបត្តិរួមមាន ការចំណាយ និងការធានាប្រដាប់ប្រើប្រាស់ទាំងអស់ ចំណីមានជីវជាតិគ្រប់គ្រាន់ និងចំណាយលើការឲ្យចំណី ការធ្វើរបងការពារ និងបញ្ហាដែលកើតមានឡើង ដូចជាទ្រុងសើមនៅរដូវភ្លៀង ដែលជាមូលហេតុបណ្តាលឲ្យកើតមានជំងឺ និងបញ្ហាព្រូន ។

ការចិញ្ចឹមដោយដាក់ទ្រុងតូចៗ (cages):

ទ្រុងតូចៗអាចសន្សំសំចៃផ្នែករាលបានច្រើន, និងបើសិនជាពួកខ្ពស់ពីដីអាចជៀសវាងការប៉ះពាល់នឹងលាមក, បក្សីត្រូវការការពារប្រឆាំងនឹងជំងឺផ្សេងៗ, ថៃ, និងប៉ារ៉ាស៊ីត ។ គេត្រូវចំណាយលើទ្រុងនេះយ៉ាងច្រើនពីដំបូង និងដែលចាំបាច់តម្រូវឲ្យមានប្រព័ន្ធប្រមូលលាមកចោលផង ។


ការចិញ្ចឹមដោយបង្ខាំង (confinement rearing):

ការចិញ្ចឹមបែបនេះអាចមានការការពារបានច្រើនពីសត្វចង្រៃ និងជំងឺផ្សេងៗ បើសិនជាមានវិធានការអានាម័យត្រឹមត្រូវ ដោយហាមមនុស្សចូលមើល មិនឲ្យមានចាស់ៗ ឬសត្វចិញ្ចឹមលែង ឬកន្លាតចូលក្នុងទ្រុងឡើយ ។ សារធាតុចិញ្ចឹមសំខាន់ៗទាំងអស់ត្រូវបានគេផ្តល់ឲ្យសត្វដោយលាយក្នុង ចំណី ។ ចន្លោះលំហែរដែលទុកសំរាប់សត្វនីមួយៗ គប្បីទុក ៦៥០ស.មកាវ៉េ ចំពោះសត្វដែលមានអាយុ៥សប្តាហ៍ដំបូង និងសំរាប់មាន់ធំត្រូវបង្កើនរហូតដល់ ២.៧៥០ស.មកាវ៉េ ។ កំរាលខាងក្រោម តាមធម្មតាគេក្រាលកំរាលកំរស់ពី ៥ ទៅ១០ស.ម ។ ប្រភេទនៃកំរាលសម្រាប់ឲ្យសត្វដេកត្រូវបានគេជ្រើសរើសអាស្រ័យទៅតាមតំលៃ និងលទ្ធភាពដែលអាចរកបាននៅក្នុងស្រុក ។ សំភារៈដែលគេចូលចិត្តដាក់សំរាប់ជាកំរាលរួមមាន រុក្ខជាតិពុកផុយតូចៗ ចំបើងស្រូវចិញ្ច្រាំ ចំបើងចំណាំងឈើតូចៗ ឬអាចម៍ដែកឈូស អាចម៍រណា (ប្រើបានតែ៤អាទិត្យតែប៉ុណ្ណោះ) ចំរៀកសំបកត្នោត កំទេចស្នូលពោត ជួនកាលមានគ្រោះថ្នាក់ ដោយស្រមើល) កំទេចសំបកសណ្តែកដី សំបកអំពៅ ក្រដាសកាសែត និងដីខ្សាច់ (នេះជាការជ្រើសរើសចុងក្រោយ) ។ ចំពោះកំរាលដែលមានគុណភាពមិនល្អ គេគួរធ្វើទ្រុងឲ្យបានធំបន្តិច ដើម្បីឲ្យកំរាលនោះស្ថិតនៅជាភាពស្ងួតជានិច្ច ។ ស្មៅចិញ្ចៀន ឬចំបើង ឬគ្រាប់ធញ្ញជាតិរឹង អាចបណ្តាលឲ្យសត្វកើតជំងឺ " ប៉ោងគែរ " ម្យ៉ាងវិញទៀតបើមានមានលក្ខណៈបែបនេះ គេគួរសំលាប់វាយកសាច់ ពីព្រោះមិនមានឱសថណាព្យាបាលបានឡើយ ។

ប្រដាប់ដាក់ចាប់សត្វ គឺជាឧបករណ៍ដ៏មានប្រយោជន៍

ទំព្រកសំរាប់ចាប់មាន់នេះ ជាឧបករណ៍មួយដែលមានប្រយោជន៍

1 - ទំព្រកនេះ ធ្វើអំពីឡឃ្នុស រឺ សសៃដេក




2 - ទំព្រកនេះ ត្រូវសំរាប់ទាក់រង្វីងមាន់ ម ចូរូបយកនៅពេលចាប់
និង នួចចាប់វា ម



ការថ្លឹងមាន់

ថ្លឹងមាន់

1. រុក្ខតនិទ្ទេស, ថ្លឹងចម្រង់ និង កត់ត្រានៃការធ្វើ



2 - រៀបចំរបៀបការធ្វើ ជាមួយនិងគោលការណ៍ ដែលបានកំណត់

3 - វិភាគ និង ការធ្វើអាសវិទ្យាស្តង់ដារលើកម្មកាន់តែទឹកចំរើន


ក/ ជំងឺចោងតែ



ខ/ ការសំលាប់មាន់សំរាប់វះពិនិត្យក្រោយពេលសត្វងាប់



គ/ តំបន់ដែលត្រូវកាត់ចំពុះ



ការចឹកគ្នា (cannibalism)

ការកាត់ចំពុះ គឺជាវិធីសាស្ត្រនៃការកាត់ ឬដុតចំពុះទាំងលើ ទាំងក្រោម ។ បើសិនជាការធ្វើដូច្នោះ បានត្រឹមត្រូវល្អ គឺដើម្បីការពារកុំឲ្យសត្វចឹកស៊ីសាច់គ្នា ដែលជាទំលាប់អាក្រក់នៃការចឹករោម ឬចឹក ដំបៅសត្វផ្សេងទៀត ។ អ្នកចិញ្ចឹមមាន់សាច់ និងមាន់ពងទាំងឡាយត្រូវអនុវត្តន៍នូវការកាត់ចំពុះមាន់

ទាំងអស់នៅ កន្លែងភ្នាក់ងារ ។ ចំពោះមាន់សាច់ គេត្រូវកាត់ប្រហែល ១/៣ នៃចំពុះនោះ ។ សំរាប់មាន់
យកពងដែលរស់នៅរយៈពេលយូរ គេត្រូវកាត់ខាងលើ ១/៣ ទៅ ២/៣ និងកាត់ចំពុះខាងក្រោម ១/៤
ទៅ ១/៣ ។ បើសិនជាគេមិនអាចរកម៉ាស៊ីនកាត់ចំពុះបាន គេអាចប្រើកន្ត្រៃ ឬកាំបិតមុតក៏បាន ។
បើសិនជាមានចេញឈាមតិចៗ ត្រូវជ្រលក់ចំពុះដែលកាត់នៅស្រស់ៗនោះទៅក្នុងចំណី ។ មាន់
ដែលចិញ្ចឹមលែង គួរតែកាត់ចំពុះ នៅពេលមានការចឹកគ្នាកើតឡើង ។ គួរជៀសវាងការកាត់ចំពុះ
ជ្រៅពេក ។

វិធីសាស្ត្រមួយទៀតគឺការការពារកុំឲ្យចឹកគ្នា ជួនកាលគេត្រូវការផងដែរ ។ សញ្ញាដំបូង វាចឹកទាញ
រោមគ្នា ឬមានរហូតដល់ហូរចេញឈាម សត្វរងគ្រោះគួរដកចេញពីទ្រុង ។ ការចិញ្ចឹមមាន់ដោយប្រើ
ពន្លឺព្រិលៗ ឬស្រអាបៗ (ការចិញ្ចឹមក្នុងទ្រុងឯង) គឺជាមធ្យោបាយមួយដ៏មានប្រសិទ្ធភាព គឺ
មានន័យថា គេអាចការពារបានពីការចឹកគ្នា ។ ទ្រុងចិញ្ចឹមនេះត្រូវការបង្ហូរចបន្តិចបន្តួច ប៉ុន្តែត្រូវមាន
កង្ហារបក់ចេញចូល និងផ្តល់ពន្លឺស្រអាបដោយដាក់ អំពូលភ្លើងតូចៗមួយចំនួន ។ បើគ្មានអំពូលភ្លើង
ទេ គេអាចប្រើទៀនក៏បាន ។ ចូរដាក់ស្លកទឹក ស្លកចំណីឲ្យបានច្រើន ដើម្បីការពារពីការបាត់បង់
ជាតិទឹក និងបាត់បង់ទំងន់ក្នុងពេលឯង ។

(ដកស្រង់ចេញពី ខេមបូឌាអេចប្រេសញ្ញស៍)