

# ការថែទាំមេជ្រូក

មេជ្រូកទាមទារការមើលថែទាំច្រើនជាងជ្រូកសាច់ ចាប់តាំងពីចិញ្ចឹមដំបូងរហូតដល់រយៈពេលវាមានកូន ។

## ពេលកើតកូន

ត្រូវរៀបចំបារ ឬចំបើងស្ងួត និងសំភារៈផ្សេងទៀត ។ ពេលមេជ្រូកកើតកូន យើងត្រូវនៅចាំជួយវាជានិច្ច ព្រោះវាអាចប្រឈមមុននឹងគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើន ។

## ត្រៀមសំភារៈមុនពេលកើត



## ជៀងវាង

មិនត្រូវដឹកមេជ្រូកដើមទៅឆ្ងាយ ដេញបង្ហើល ឬវាយដំទេ ព្រោះវាងាយនឹងរលូតកូន ។ យកល្អ គួរដាក់វានៅទ្រុងផ្សេងពីជ្រូកសាច់ ។

## អាការៈមេជ្រូកមុនពេលកើត

- មេជ្រូកជិតកើតកូន មានអាការៈមិនស្រណុក នោម ច្រិចៗ ដើរចុះដើរឡើង និងស៊ីចំណីតិច ។ ពេលខ្លះ វាល្មុលតាមជញ្ជាំង ខាំចំបើង ឬកកេរទ្រុង ដើម្បីកាច់សំបុក ។
- មេជ្រូកដើរកន្លែកជើងក្រោយ ប្រដាប់បន្តពូជរីកធំ និងមានហូរទឹកអំលិលពណ៌លឿង (ទឹកភ្លោះ) ។



- ករណីដែលមេជ្រូកបែកទឹកភ្លោះ ពី ៣ម៉ោង ទៅ ៦ម៉ោង ហើយនៅតែមិនឃើញកើតកូន ត្រូវ ទៅតាមពេទ្យសត្វ ប្រចាំភូមិ ដើម្បីជួយសង្គ្រោះជាបន្ទាន់ ។

**គួរដឹង**

ធម្មតាមេជ្រូកកើតកូននៅពេលយប់ ។ មេដែលកើតកូនក្នុងរយៈពេល ១០ម៉ោង ក្រោយពេល ឈឺពោះ ហើយក្នុងរយៈពេល ៤ ម៉ោង សំរាប់មេដែលធ្លាប់កើតកូន ២-៣ ដងហើយ ។ ចន្លោះពី ការកើតកូន១ទៅ១ មានរយៈពេលពី១០ ទៅ ១៥នាទី តែបើលើសពីនេះ ត្រូវទៅតាមភ្នាក់ងារ សុខភាពសត្វប្រចាំភូមិជាបន្ទាន់ ។

**វិធីជួយមេជ្រូក**

- ត្រូវកាត់ក្រចកដៃឲ្យខ្លី លាងដៃនឹងអាល់កុលឲ្យស្អាត និងពាក់ស្រោមដៃ ប្រសិនបើមាន មុន ទៅជួយបង្កើតកូនជ្រូក ដើម្បីកុំឲ្យមុត និងឆ្លងមេរោគដល់មេ និងកូនជ្រូក ។
- នៅពេលមេជ្រូកប្រឹងបញ្ចេញកូនមកក្រៅ យើងត្រូវជួយទាញកូនចេញដោយប្រុងប្រយ័ត្ន តាមចង្វាក់ធាក់ចេញរបស់មេ ។ ប្រសិនបើកូនជ្រូកកើតមកមានទងផ្ចិតជាប់នឹងសុក ដែល នៅក្នុងពោះមេ ត្រូវទាញផ្តាច់ថ្មមៗ ។



**គួរដឹង**

ប្រសិនបើកូនកើតរហ័សជាប់ៗគ្នា ត្រូវជូតកូនឲ្យស្ងួត រួចដាក់ក្នុងឡាំងសិន ទើបកាត់ផ្ចិតតាម ក្រោយ។



- យកក្រណាត់ស្អាតជូតទឹកភ្លោះត្រង់ច្រមុះ មាត់ និងត្រចៀកកូនជ្រូក ។ បើមានស្រោមនៅជាប់នឹងខ្លួនវា ត្រូវបកចេញឲ្យលឿន កុំឲ្យកូនជ្រូកថប់ដង្ហើម ។
- យកអំបោះ ចងទងផ្ចិតកូនជ្រូកប្រវែង ២ឆ្នាប់ដៃ (២សម) ពីពោះ រួចកាត់ប្រវែង ១ឆ្នាប់ (១សម) ពីចំណង ដោយកន្ត្រៃដែលស្ទើរសំលាប់មេរោគហើយ ។ បន្ទាប់មកយកថ្នាំក្រហមលាបសម្លាប់មេរោគនៅកន្លែងដែលកាត់នោះ ។

**គួរដឹង**

- បើកូនជ្រូកស្ទុះខ្យល់ត្រូវយកម្រាមដៃលូកចូលមាត់វា រួចខ្វះ យកទឹកសំបោរចេញហើយផ្គុំខ្យល់ចេញពីមាត់កូនជ្រូក ដោយសំយ៉ុងក្បាលវាចុះក្រោម ។
- សុកអាចនិងធ្លាក់មកជាមួយកូនចុងក្រោយ ឬ៣០នាទីបន្ទាប់ពីកើតកូនអស់ ។ ត្រូវយកសុកទៅកប់ឲ្យឆ្ងាយ ។ មិនត្រូវឲ្យមេជ្រូកស៊ីសុករបស់វាទេ ព្រោះសុកស្ងិតធ្វើឲ្យក្រពះជ្រូកពិបាកកិនរំលាយ និងមានមេរោគច្រើន ។
- យកកន្ត្រៃកាត់ចង្កូមរបស់កូនជ្រូកចេញ ដើម្បីកុំឲ្យវាខាំដោះមេឬខាំគ្នា ពេលកំពុងបៅ តែកុំកាត់ដល់អញ្ចាញ ព្រោះនាំឲ្យរូសហូរឈាម ។
- ពេលកើតកូនអស់ហើយ ត្រូវយកកូនជ្រូកទាំងអស់ទៅបៅដោះមេវាភ្លាម ដើម្បីទទួលទឹកដោះដំបូង ។ ប៉ុន្តែត្រូវជូតសំអាតជាតិអិលនៅលើដោះទាំងបីរជូររបស់មេសិន ។



**រៀងរាល់**

ក្នុងរយៈពេល១ អាទិត្យដំបូង មិនត្រូវដាក់កូនជ្រូកទើបនឹងកើតនៅក្នុងទ្រុងជាមួយមេទេ ព្រោះមេជ្រូកអាចនឹងជាន់ ឬ ដេកកិនលើ ។

**ហេតុអ្វីត្រូវឲ្យកូនជ្រូកបោទឹកដោះដំបូង ?**

- ទឹកដោះដំបូងមានជាតិកូឡូស្តូម ដែលធ្វើឲ្យកូនជ្រូកមានសុខភាពល្អ មានកំដៅប្រឆាំង នឹងធាតុត្រជាក់ ហើយស្ប៉ានឹងជំងឺទៀតផង ។

**ក្រោយពេលកើតកូន**

ត្រូវឲ្យមេជ្រូកស៊ីបបរាវ និងបន្ថែមបន្ថែមបានច្រើន ដើម្បីកុំឲ្យទល់លាមក ។ ចំពោះកូនមិនត្រូវឲ្យស៊ីចំណីផ្សេងក្រៅពីទឹកដោះមេ ក្នុងរយៈពេល ១អាទិត្យដំបូង ។

**ចំពោះកូនជ្រូកបោដោះ**

- ឲ្យកូនជ្រូកបោរយៈពេលពី ១០ ទៅ ១៥នាទី រាល់២ម៉ោង ម្តងនៅពេលថ្ងៃ និងរាល់៣ទៅ ៤ម៉ោង ម្តង នៅពេលយប់ ។
- ពេលកូនជ្រូកអាយុបាន ៧ថ្ងៃ ត្រូវឲ្យបបរដោយបន្ថែមកន្ទក់ម៉ត់ ឬកោសសាច់ចេកណាំវ៉ាទុំ ឬទិញចំណីសំរេចមកឲ្យកូនជ្រូកស៊ី ៤ដងក្នុង១ថ្ងៃ គឺឆ្ងាស់គ្នាពេលបោ ។ រួចបន្ថែមចំណីជាបន្តបន្ទាប់ រហូតដល់ពេលត្រូវផ្តាច់ដោះ ។



**ហេតុអ្វីត្រូវបង្កាត់កូនជ្រូកឲ្យចេះស៊ីចំណី ?**

ដើម្បីឲ្យពួកវាមានភាពផ្សំនឹងចំណីបន្តិចម្តងៗ ហើយមានភាពរឹងមាំ នៅពេលផ្តាច់ដោះ និងមិនធ្វើឲ្យមេជ្រូកចុះស្គម ដោយសារតែកូនបោឡាឆ្នាំងពេក ។

**ចំពោះកូនជ្រូកផ្តាច់ដោះ**

- ត្រូវបង្ហាត់កូនជ្រូកឲ្យនៅផ្សេងពីមេ គឺឲ្យកូនជ្រូកនៅក្នុងទ្រុងដដែល ហើយយកមេទៅដាក់ក្នុងទ្រុងផ្សេងទៀត ។
- ត្រូវកាត់បន្ថយចំនួននៃការបោបណ្តើរៗ ក្នុងរយៈពេល ១អាទិត្យ ។ ថ្ងៃទី១ ឲ្យបោ ៥ដង , ថ្ងៃទី២ ឲ្យបោ៤ដង , ថ្ងៃទី៣ ឲ្យបោ៣ដង , ថ្ងៃទី៤ ឲ្យ២ដង , ថ្ងៃទី៥ ឲ្យបោ ១ដង និងថ្ងៃទី៦ លែងឲ្យបោតែម្តង ។ ហើយបន្តឲ្យកូនជ្រូកស៊ីចំណីតែមួយប្រភេទ ដូចមុនពេលផ្តាច់ដោះ ។



**គួរដឹង**

ការឆាប់ផ្តាច់ដោះកូន ជាការសំខាន់ ដើម្បីឲ្យមេជ្រូកបង្កើតកូនបានច្រើនដង ។ កាលណាយើងផ្តាច់ដោះរហ័ស មេជ្រូកក៏រហ័សរកឈ្មោលដែរ ។ នៅប្រទេសជប៉ុនល្បីនមួយចំនួន គេផ្តាច់ដោះ

នៅពេលកូនជ្រូកអាយុពី២០ ទៅ ៣០ថ្ងៃ ។ ឯនៅប្រទេសយើងវិញ គេផ្តាច់ដោះកូនជ្រូកពេលវា អាយុបានពី ៤០ទៅ ៥០ថ្ងៃ ព្រោះពេលនោះទឹកដោះមេក៏ចាប់ផ្តើមថយចុះ ហើយកូនជ្រូកក៏ចេះស៊ី ចំណីហើយដែរ ។

**ចំពោះមេជ្រូកបំបៅកូន**

- ជាទូទៅ មេជ្រូកដែលទើបកើតកូនរួច ច្រើន ទល់លាមកដូច្នោះយើងត្រូវផ្តល់បបររាវ និង បន្លែមបន្លែឲ្យច្រើន ។ ហើយត្រូវឧស្សាហ៍ឲ្យ មេជ្រូកដើរ ដើម្បីជួយបង្កើតទឹកដោះ និងកុំ ឲ្យវាមានបញ្ហាជើង ។
- ត្រូវឲ្យចំណីវាស៊ីតិចៗតែច្រើនដង ។ ប្រសិនបើមានលទ្ធភាពគួរទិញមេចំណី ដែលគេ ធ្វើឡើងសំរាប់មេជ្រូកមកលាយជាមួយចំណីផ្សេងៗទៀត ដើម្បីបង្កើនទឹកដោះ ។ លុះដល់ ថ្ងៃទី ៥ ទើបបន្ថែមបរិមាណចំណីបន្តិចម្តងៗវិញ ។



**គួរដឹង**

ក្រោយផ្តាច់ដោះកូនពី ៣ ទៅ ១៤ថ្ងៃ មេជ្រូកនឹងចាប់ផ្តើមរកឈ្មោលហើយ ។

**តើធ្វើយ៉ាងម៉េច បើមេជ្រូកក្រវកឈ្មោល ?**

- បន្ថយការផ្តល់ចំណី ដើម្បីឲ្យមេជ្រូកមានការធុនថប់ ។
- យកជ្រូកបាឲ្យដើរកាត់មុនជ្រូកមេ ឬ យកទឹកនោមជ្រូកបាស្រោចលើបារដែលនៅក្នុងទ្រុងមេ ឲ្យបាន ២ដងក្នុង ១ថ្ងៃ ។
- កិនគ្រាប់ឈូកស្ងួត ១គក លាយជាមួយ កន្ទក់ ឬបាយ ២០គក ហើយឲ្យវាស៊ី២ដង ក្នុង មួយថ្ងៃ ។
- ចុងក្រោយ ប្រសិនបើនៅពុំទាន់រកឈ្មោលទៀត ត្រូវសុំយោបល់ពីពេទ្យសត្វ ។

## ការការពារជំងឺផ្សេងៗ

ដើម្បីឲ្យមេជ្រូក និងកូនជ្រូកមានសុខភាពល្អ ត្រូវលាងសំអាតទ្រូង និងកំរាលជាប្រចាំ ។ ជាពិសេស ត្រូវចាក់ថ្នាំទំលាក់ព្រូន និងថ្នាំបង្ការ ជំងឺផ្សេងៗឲ្យបានទៀងទាត់ ។

### ការសំអាតទ្រូង

ត្រូវយកប្រភពមេរោគចេញពីទ្រូងឲ្យអស់ ដូចជា លាមក ទឹកនោម និងសំរាមផ្សេងៗ ។



### គូរជីង

ត្រូវរក្សាទ្រូង និងកំរាលឲ្យមានកំដៅសមល្មម និងស្ងួតល្អ កាលណាទ្រូងសើម ឬត្រជាក់ អាចធ្វើឲ្យកូនជ្រូកកើតជំងឺហើមស្ងួត រាក និងងាយ ឆ្លងជំងឺផ្សេងៗទៀត ។

### ជៀងវាង

- ចំពោះជ្រូកទើបនឹងទិញថ្មី ត្រូវដាក់នៅដោយឡែកពីគេរយៈពេលពី២ទៅ ៣អាទិត្យ ព្រោះវាអាចផ្ទុកជំងឺ ។ ក្នុងរយៈពេលនោះ ប្រសិនបើជ្រូកថ្មីគ្មានជំងឺទេ យើងអាចបញ្ចូលវាទៅក្នុងទ្រូងជាមួយជ្រូកចាស់ៗបានហើយ ។
- មិនត្រូវព្យាបាលជ្រូកមានជំងឺដោយខ្លួនឯងទេ ។ ត្រូវហៅភ្នាក់ងារសុខភាពសត្វ (ពេទ្យសត្វ) តាមភូមិ ស្រុក ឬពេទ្យសត្វដែលមានការបណ្តុះបណ្តាលត្រឹមត្រូវមកព្យាបាល ។

### ការចាក់ថ្នាំទំលាក់ព្រូន

- ចំពោះមេជ្រូក ត្រូវចាក់ថ្នាំទំលាក់ព្រូន មុនពេលដាក់បា និងមុនពេលកើតកូន ២អាទិត្យ ។
- ចំពោះកូនជ្រូក ត្រូវចាក់លើកទី១ នៅពេលផ្តាច់ដោះលើកទី២ ក្រោយពេលផ្តាច់ដោះ បាន ១ ខែ និងលើកទី៣ នៅពេលវាអាយុ បាន៥ខែ ។



**គួរដឹង**

- អ្នកចិញ្ចឹមអាចចាក់ ថ្នាំទំលាក់ព្រូន ឬថ្នាំ បង្ការដោយខ្លួនឯងបាន ប៉ុន្តែត្រូវសួរពេទ្យសត្វ ឬ អ្នកលក់ថ្នាំសត្វឲ្យបានច្បាស់ពីរបៀបចាក់ និងប្រើថ្នាំ ។
- គេអាចប្រើថ្នាំ ម្សៅដាក់លាយជាមួយចំណីឲ្យជ្រូកស៊ី ដើម្បីទំលាក់ព្រូនក៏បាន ។ វាមាន ប្រសិទ្ធភាពដូចថ្នាំចាក់ដែរ និងងាយស្រួលធ្វើទៀតផង ។
- គេមិនអាចចាក់ថ្នាំបង្ការ លើសត្វឈឺ បានទេ គឺចាក់បានតែសត្វដែលមានសុខភាពល្អ ប៉ុណ្ណោះ ។

**ការចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺដល់មេជ្រូក**

អាយុជ្រូក	ប្រភេទជំងឺ
មុនពេលដាក់បា	ចាក់ថ្នាំការពារមេរោគសារទឹករាល់១ឆ្នាំម្តង ។
មេជ្រូកដើមបាន ១២ អាទិត្យ	ចាក់ថ្នាំការពារមេរោគអុតក្តាម ។
ក្រោយពីកើតកូន២អាទិត្យ	ចាក់ថ្នាំការពារជំងឺប៉េស្ត ។

**គួរដឹង**

- ជំងឺសាហារដែលកើតញឹកញាប់ និងមិនអាចព្យាបាលបាន ហើយធ្វើឲ្យជ្រូកស្លាប់ គឺ ជំងឺប៉េស្ត។ ឯជំងឺផ្សេងទៀត មិនអាចធ្វើឲ្យជ្រូកស្លាប់បានទេ គ្រាន់តែខាតថ្លៃព្យាបាល និង ពេលវេលាប៉ុណ្ណោះ ។
- ប្រសិនបើជ្រូកកើតជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ មិនអាចព្យាបាលបាន ត្រូវសំលាប់វាចោល ដើម្បីកុំឲ្យឆ្លងទៅ ជ្រូកដទៃទៀត ។



**ការចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺដល់កូនជ្រូក**

អាយុជ្រូក	ប្រភេទជំងឺ
២អាទិត្យ	ចាក់ថ្នាំការពារជំងឺសាល់ម៉ូណោឡូស ។
៤អាទិត្យ	ចាក់ថ្នាំការពារជំងឺសារទឹក ។
៦អាទិត្យ	ចាក់ថ្នាំការពារជំងឺអុតក្តាម និងជំងឺសាល់ម៉ូណោឡូសលើកទី២ ។
៧អាទិត្យ	ចាក់ថ្នាំការពារជំងឺសារទឹកលើកទី២ ។

**គួរដឹង**

ជាធម្មតា កូនជ្រូកត្រូវការជាតិដែកពី៧ ទៅ ៩មីលីក្រាម ក្នុងមួយថ្ងៃ ឯជាតិដែកដែលមេវាផ្តល់ឲ្យតាមរយៈទឹកដោះបានតែ១ ទៅ២មីលីក្រាមប៉ុណ្ណោះក្នុង១ថ្ងៃ ។ ដូច្នេះយើងត្រូវចាក់ជាតិដែក បន្ថែមដល់កូនជ្រូកនៅពេលវាអាយុបាន ៣ ថ្ងៃ និងចាក់លើកទី២ នៅអាយុ ២១ ថ្ងៃ ។ ការខ្វះជាតិដែកធ្វើឲ្យកូនជ្រូកក្រិន ក្រធំ និងកើតជំងឺរាក ។

(ដកស្រង់ចេញពីទស្សនាវដ្តី របស់អង្គការពេទ្យសត្វគ្មានព្រំដែន)