



II. បច្ចេកទេសដាំដុះ

ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការដាំដុះលូតលាស់ ព្រមទាំងទទួលបាន ទិន្នផលខ្ពស់មានលក្ខខណ្ឌជាច្រើនដែលតម្រូវឱ្យធ្វើការជ្រើសរើសដូចជា:

១-អំពីរដូវកាល: ឆែវជាប្រភេទដំណាំដែលអាចដុះលូតលាស់មិន ប្រកាន់រដូវ គេអាចដាំបានស្ទើរពេញ១ឆ្នាំនៅក្នុងតំបន់ក្តៅ (Tropic)។ ប៉ុន្តែ ការជ្រើសរើស រដូវវាមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងសត្វល្អិតចង្រៃស៊ីបំផ្លាញព្រម ទាំងធ្វើឱ្យទិន្នផលថយចុះ សីតុណ្ហភាពសមស្របបំផុតចន្លោះពី ២០-២៥ °C កាលណាកើនពី ២៥-៣០°C ការផ្តល់ទឹកបានច្រើន ទើបទទួលបាន ទិន្នផលល្អ។ នៅប្រទេសកម្ពុជាគេអាចដាំដុះបានល្អនៅរដូវទឹកស្រកចាប់ពី



ដំណាំឆែវ

I. ស្ថានភាពទូទៅ

ដំណាំស្ពៃមើម ឬដំណាំឆែវជាប្រភេទដំណាំម្យ៉ាងដែលមានប្រជាប្រិយ យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ជាម្ហូបអាហារប្រចាំថ្ងៃ។ ក្នុងការបរិភោគ គេអាចចែកចេញជាពីរប្រភេទគឺ: មើមនៅ

ឬចំអិនដំណាំនេះមានប្រភពកំនើតមក ពីប្រទេសចិន គេបានប្រើប្រាស់វាតាំងពី យូរយារណាស់មកហើយយើងអាចយកវា ទៅកែច្នៃធ្វើជាជ្រក់ នៃប៊ូរ ជាដើមក្នុង ទំងន់១០០ក្រាម ដែលបរិភោគ (មើម) សារធាតុសំខាន់ៗជាច្រើនដូចជា:



បរិភោគ	ថាមពល	ទឹក%	ប្រូតេអ៊ីន	ខ្លាញ់	កាបូអ៊ីដ្រាត	ជាតិសរសៃ	ផេះ
ដើមស្រស់	២៦	៩២.៦	១	០.២	៥.៦	១.៣	០.៦
មើមចំអិន	១៩	៩៤.៥	០.២	០.៤	៤K ៧	០០	០.៥
បរិភោគ	Ca mg	P mg	Fe mg	Na mg	K mg	Bo mg	B mg
ដើមស្រស់	៣២	៣៤	១.០	១០	២៤២	០.០៤	២៦
មើមចំអិន	៤០	២.២	០.២	០០	០០	០.០៣	១៩



- ពូជជាច្រើនប្រភេទទៀតមកពីប្រទេសជប៉ុនផលិតដោយ ក្រុមហ៊ុន ពីរគឺ Sakata Seed និង Kaneco Seed ដែលអាចដាំដុះបាន ។

៣-ការស្រែសរសៃ និងរៀបចំដី

- អំពីប្រភេទដី: ឆែងជាប្រភេទដំណាំយកមើមដែលលូតលាស់ នៅក្នុងស្រទាប់ដីប៉ែកខាងលើ ម្យ៉ាងទៀតវាជាប្រភេទដំណាំដែលមាន វដ្តជីវិតខ្លីដូចនេះតម្រូវការដីដែលមានជីជាតិគ្រប់គ្រាន់ ។ លក្ខខណ្ឌដែល សមស្របសំរាប់ធ្វើការដាំដុះគឺដីធ្ងរ ជ្រាបទឹកបានល្អ ស្រទាប់ដាំដុះជ្រៅដុះ លើដីខ្សាច់ច្រើនជាងកណ្តោងជាពិសេស គឺដីល្បាយខ្សាច់ ដីល្បប់មាត់ស្ទឹង ព្រែក ទន្លេ វាមិនអាចដុះលូតលាស់លើប្រភេទដីឥដ្ឋបានឡើយ ប៉ុន្តែវាក៏ អាចដុះលូតលាស់ល្អលើដីក្រហមខ្ពង់រាបដែរ ។



ខែ តុលា ដល់ខែ មករា កាលណា ពន្យារពេលរហូតដល់ កុម្ភៈ ឬមិនា តែង ទទួលរងនូវការបំផ្លាញ ពីសត្វល្អិតចង្រៃ ជាច្រើន ។

២-ការស្រែសរសៃពូជ

ដំណាំប្រភេទនេះមិនអាចផលិតពូជ នៅក្នុងប្រទេសយើងបានឡើយ ដូចនេះ ពូជសុទ្ធតែនាំមកពីប្រទេសនានាក្នុងតំបន់អាស៊ី ដែលផលិតដោយ ក្រុមហ៊ុនជាច្រើន ហើយត្រូវបានពិសោធន៍ វាយតម្លៃទៅលើភាពបន្តក្នុង លក្ខខណ្ឌប្រទេសកម្ពុជាភាគច្រើនជាពូជអាយុកាលលូតលាស់ខ្លី (ពូជ ស្រាល) និងពូជអាយុកាលលូតលាស់មធ្យម (ពូជកណ្តាល) ប៉ុន្តែចំពោះ ពូជធ្ងន់មិនសមស្របទៅនឹងលក្ខខណ្ឌនៃប្រទេស យើងឡើយ ។ ពូជដែល ត្រូវបានណែនាំឱ្យប្រើប្រាស់មាន:

- ពូជ R៦១៩៧ និងពូជKao yuak១៨មកពីប្រទេសថៃដែលផលិត ដោយក្រុមហ៊ុន East west seed
- ពូជ ៥៥ថៃ មកពីប្រទេសថៃ ផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Chea tai seed សញ្ជាយន្តហោះ
- ពូជ Everst (F១) មកពីប្រទេសជប៉ុនផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Takiiseed
- ពូជ wang jian មកពីចិនហុងកុង ដែលផលិតដោយ Hong kong Field Friend Agriculture Unite .Co ហើយកំពុងពេញនិយមទូទាំងប្រទេស កម្ពុជា ចាប់ពីឆ្នាំ២០០១ មក។

៤- របៀបដាំដុះ

ឆែងចារគេដាំវានឹងគ្រាប់ផ្ទាល់ ដូចនេះមុននឹងយកគ្រាប់ទៅដាំ ត្រូវយកគ្រាប់ពូជនោះដាក់ហាលថ្ងៃឱ្យក្តៅរយៈពេល ១-២ម៉ោង ក្រោយមកដាក់គ្រាប់ទឹក ៣-៤ម៉ោង នឹងលាងសំអាតគ្រាប់ឱ្យបានច្រើនលើកព្រមទាំងលាយផ្ទាំការពារជំងឺតបន្តិចៗ(១គក្រ គ្រាប់ = ២ក្រាមផ្ទាំ) ។ វិធីសាស្ត្រក្នុងការដាំដុះគឺយកគ្រាប់ពូជទៅដាំលើផ្ទាល់ ផ្ទាល់ដោយដាក់ក្នុងជំពៅ២ ស.ម ជាមធ្យមក្នុងមួយគុម្ព ២គ្រាប់ ហើយចន្លោះជួរ នឹង គុម្ព ២០សម យ ២០សម ក្រោយពីដាំហើយយកចំបើងស្លូតទៅពង្រាយគ្របពីលើផ្ទៃ រងឱ្យបាន ៧០ ទៅ ៨០% ដើម្បីការពារសំណើម និងភាពហាប់ណែននៃដីជួយឱ្យ ឆែងចារដុះលូតលាស់បានល្អ ប៉ុន្តែក្រោយពីដាំត្រូវស្រោចទឹកឱ្យជោគភ្លាម ។



ជាទូទៅកំរិត pH ៦-៧,៥មានអំណោយផលល្អបំផុតសំរាប់ការដុះលូតលាស់ និង ទិន្នផលខ្ពស់ ។

- ការរៀបចំដី: ត្រូវរាស់ប្រមូលយកស្មៅ កាកសំណល់ផ្សេងៗចេញពីចំការ ហើយភ្ជួរឱ្យជ្រៅហាលដីឱ្យស្លូតដើម្បីបន្ថយការដុះស្មៅនិងកត្តាចង្រៃដែលរស់ នៅក្នុងដីបន្ទាប់មករាស់បំបែកដីឱ្យល្អិតកៀរដីឱ្យស្មើ ។ ការភ្ជួររាស់ត្រូវធ្វើឱ្យបាន ២-៣ លើក ដើម្បីឱ្យដីមានបន្ទុកខ្យល់គ្រប់គ្រាន់ព្រមទាំងធ្វើឱ្យដីធ្ងរជ្រាប ទឹកបានល្អ ហើយត្រូវលើករងឱ្យមានកំពស់២៥-៣០សម ទទឹងរង ១០០-១២០ សម បន្ទាប់មកយកដីគីមីប្រភេទ ១៥.១៥.១៥ ២០០គក្រ ដីធម្មជាតិ ១៥-១៨ តោន លើផ្ទៃដី ១ ហិ.ត បាចលើរង ហើយរាស់លុបកៀរឱ្យស្មើ នឹងអាចដាំបាន ។

នៅក្នុងវគ្គនេះ កាលណាសំណើមដីសើមខ្លាំងលើសសេចក្តីត្រូវការ ធ្វើឱ្យ កូនដំណាំរលួយឬសទៅវិញ ។

- វគ្គលូតលាស់ស្លឹកពិត: ក្រោយពីដុះពន្លក ១០០% រយៈពេល ៧- ១០ថ្ងៃ ឆែងវគ្គដុះបានស្លឹកពិត ២-៣ សន្លឹក វាត្រូវការទឹកកំរិតមធ្យម ប្រហែលគ្នានឹងវគ្គដុះពន្លកដែរ ប៉ុន្តែទាបជាងបន្តិចកាលណាស្រោច ទឹកខ្លាំងសំណើមដីខ្ពស់ធ្វើឱ្យគល់ កូនឆែងវគ្គប្រេះ អាចធ្វើឱ្យយឺតយ៉ាវ វគ្គ កំណកំណើតមើម ។

- វគ្គកំណកំណើត និងពង្រីកមើម: ក្រោយពីដាំបានរយៈពេល ១៥- ១៨ថ្ងៃ គេសង្កេតឃើញឆែងវគ្គចាប់ផ្តើមពង្រីកគល់ប៉ោងបន្តិចៗ ពេលនោះ វាត្រូវការទឹក និង សារធាតុចិញ្ចឹមកាន់តែកើនឡើងៗ រហូតដល់ពេល ប្រមូលផល ដូចនេះត្រូវបង្កើតការស្រោចទឹកឱ្យខ្លាំងជាងវគ្គនានាអាចធ្វើឱ្យ ទិន្នផលឆែងវគ្គកាន់តែកើនឡើង ។

៦-ការថ្លែងយដី ជកស្មៅ



៥-ការស្រោចស្រូប

ការផ្តល់ទឹកបានគ្រប់គ្រាន់ និងទៅតាមតម្រូវការរបស់វា ធ្វើឱ្យដំណាំដុះ លូតលាស់លឿន ប៉ុន្តែសេចក្តីត្រូវការមិនដូចគ្នាទាំងស្រុងនោះឡើយ គឺ អាស្រ័យទៅតាមវគ្គលូតលាស់របស់វាដូចតទៅ:

- វគ្គដុះពន្លក: នៅក្នុងវគ្គនេះចាប់តាំងពីដាំរហូតដល់ឆែងវគ្គ ១០០% វា ត្រូវការសំណើមដីថេរ តែមិនជោគជាខ្លាំង កាលណាដីស្ងួតបណ្តាល ឱ្យក្តាំងដីធ្វើ ឱ្យដំណុះមិនស្មើគ្នា ព្រមទាំងបាត់បង់ចំនួនដើមច្រើន ដូចនេះ គេត្រូវផ្តល់ទឹកព្រឹក ល្ងាច តាមវិធីសាស្ត្រជាច្រើនដែលធ្វើទៅបានដោយ ប៉ោតដោយម៉ាស៊ីនឬមនុស្ស ។





ប៉ូន្តែជាពិសេសគឺសារធាតុអាសូត(N) ផូស្វ័រ(P)បូតាស្យូម(K) និងកាល់ស្យូម (Ca) ដូចនេះកាដាក់ដីត្រូវ ជ្រើសរើសប្រភេទដីណាដែលមានសារធាតុ N.P.K នឹង កាល់ស្យូមដើម្បីឱ្យមានធាតុកាល់ស្យូមគេច្រើនប្រើលាមកសត្វ ជាពិសេសលាមកមាន់ដាក់មុនដាំលើដី១ ហត ដាក់ចំនួន ៨០០០ - ១០.០០០ គក្រក្រៅពីនោះទៀតគេអាច ប្រើដីលាមកជ្រូកពុកផុយយូរឆ្នាំ ក៏បានដែរ។ យោងទៅតាមតម្រូវការ និងប្រភេទសារធាតុគេបែងចែកការដាក់ ដីបំប៉នចំនួន ៤លើកគឺ:

- បំប៉នលើកទី១ ប្រើដីអ៊ុយរ៉េលាយទឹកស្រោចដោយប្រើចំនួន ២៥- ៣០ គក្រលាយទឹក ២០លីត្រ លើ ផ្ទៃដី ១០ម^២ ហើយស្រោចទឹកលាងតាម ក្រោយ ១ហត គេប្រើទំងន់ ២៥-៣០គក្រ រយៈពេល ១០ថ្ងៃក្រោយដាំ។

ដើម្បីឱ្យដីធ្ងរ ព្រមទាំងទប់ស្កាត់ការដុះលូតលាស់នូវស្មៅចង្រៃហើយនឹងការ លូតលាស់ប្រពន្ធិប្រសព្វតំបូងត្រូវដករំលោះកូនឆែថាវចេញទុកតែមួយដើម ក្នុង១គុម្ព ព្រម ទាំងដកស្មៅចេញ ហើយយកកូនចមុខតូចជ្រុំដីឱ្យផុស ក្បែរៗគុម្ពពេញផ្ទៃរង ហើយផ្អាកការស្រោចទឹករយៈពេល ១ថ្ងៃ ធ្វើឱ្យដីនោះ ស្ងួតខ្យល់ចេញចូល បានល្អ រយៈពេលសមស្របក្នុងការជ្រុំជ្រួយដី គឺធ្វើឡើង ក្រោយពីដាំបានចំនួន ១៥-១៨ថ្ងៃ កាលណាពន្យារពេល ជ្រុំជ្រួយដីទុកឱ្យ ឆែថាវពង្រីកមើមកាន់តែធំអាចរំខានដល់ការវិវឌ្ឍន៍នៃប្រពន្ធិប្រសព្វរបស់វា ធ្វើឱ្យមើមតូចហើយខ្លី ។ ឆែថាវជាប្រភេទដំណាំ ត្រូវការដីជាតិច្រើនប្រភេទ ព្រមទាំងសារធាតុអ៊ែម្សែង ។

៧-ការដាក់ដីបំប៉ន

ឆែថាវជាប្រភេទដំណាំត្រូវការដីជាតិច្រើនប្រភេទព្រមទាំងសារធាតុអ៊ែម ្សែង ។



២- ដង្កូវស្លឹកកំពូល វាមានរាងតូចៗប្រហែលនឹងដង្កូវវាយោល ទោងដែរ តែមានមាឌធំហើយវែងជាងពណ៌ប្រផេះ មានពាមបន្តិច ៗ វាស៊ីស្លឹកដោយពុំបន្សល់ទុកនូវភ្នាសដូចដង្កូវវាយោលទោងឡើយព្រមទាំង លក្ខណៈជាហ្វូងផ្គុំនៅនឹងត្រួយ។



- បំប៉នលើកទី២ ប្រើដី ១៥ ១៥ ១៥ ចំនួន ២០០ក្រាមលើផ្ទៃដី ១០ម^២ ១ហ.ត ២០០គក្រ ដាក់ក្រោយជ្រំជ្រួយដី ១៥-១៨ថ្ងៃក្រោយដាំវិធីដាក់ គឺតាមចន្លោះគុម្ពហើយជ្រំដីលុបឱ្យជិត ។

- បំប៉នលើកទី៣ ប្រើដីអ៊ុយរ៉េ ៤០-៥០ក្រាម លាយទឹក២០លីត្រស្រោច ឱ្យជោគលើផ្ទៃដី១០ម^២ ហើយស្រោចទឹកលាងតាមក្រោយរយៈពេល ២៥- ៣០ថ្ងៃ ក្រោយដាំ។

- បំប៉នលើកទី៤ គេប្រើដីពីរប្រភេទរួមគ្នាក្នុងករណីធ្វើទៅបាន គឺដី អ៊ុយរ៉េចំនួន ៣០គក្រ និងដីប៉ូតាស្យូម ៥០គ.ក្រ ដោយបញ្ចូលគ្នាហើយដាក់ តាមចន្លោះគុម្ពរយៈពេល ៤០ ថ្ងៃ ក្រោយពីដាំធ្វើឱ្យឆែមមើមធំហើយមាន គុណភាពល្អ។

III. អំពីសត្វល្អិតចង្រៃ និងការការពារ

ដំណាំនៃថាវជាធម្មតាត្រូវបានរងការបំផ្លាញពីសត្វល្អិតចង្រៃសំខាន់ៗ ចំនួន ៤ប្រភេទគឺ:

១- ដង្កូវវាយោលទោង: ជាសត្រូវយ៉ាងចំបងវាស៊ីបំផ្លាញជាលិកាស្លឹក ធ្វើឱ្យ ស្លឹកនៃថាវលែងលូតលាស់បានហើយបាត់បង់ ១០០%។ នៅប្រទេស កម្ពុជាយើងការបំផ្លាញច្រើនចាប់ផ្តើមពីចុងខែមករា ដល់ខែឧសភាក្រៅពីនេះ វត្តមានរបស់វាត្រូវថយចុះមកវិញ ។ ដើម្បីការពារ និងកំចាត់ដង្កូវប្រភេទនេះ គេត្រូវសិក្សា អំពីវត្តមានមេចំណាស់របស់វាគឺមេអំបៅកាលណាមានមេអំបៅ ហើរក្នុងចំការពេលល្ងាចមិនយូរនឹងមានដង្កូវស៊ីបំផ្លាញដូចនេះគេត្រូវទប់ទល់ ជាមុនទៅតាមលក្ខណៈដែលអាចធ្វើទៅ បានជាពិសេសគឺវិធានការគីមី ។

- ការជ្រើសរើសរដូវ រដូវមានទំនាក់ទំនងគ្នាជានិច្ចទៅនឹង ការកើតនៃកត្តាចង្រៃ ព្រោះវាតែងពង្រីកពូជពង្សរបស់វានៅរដូវក្តៅ ហើយដំណាំមិនទាមទារនូវ សីតុណ្ហភាពក្តៅខ្លាំងឡើយ ។

- ការធ្វើអនាម័យចំការ សំអាតស្មៅទាំងក្នុងនិងជុំវិញចំការឱ្យបានស្អាតព្រោះវាជាជំរករបស់ភ្នាក់ងារចង្រៃគ្រប់ប្រភេទ ។

- ការអនុវត្តនវិធានការគីមី ក្នុងករណីមានដង្កូវ ៤ប្រភេទខាងលើគេប្រើប្រាស់ ថ្នាំគីមីពុលកសិកម្មក្នុងការកំចាត់ ដូចជាយកមកលាយទឹកបាញ់ឬបាចទៅក្នុងថ្នាលពេលសត្វល្អិតល្អិតក្នុងដំណាក់កាលកូនញាស់ទើបមានប្រសិទ្ធិភាពល្អ ។



៣- ដង្កូវកាត់ដើម ដង្កូវមានមាឌធំវែងៗពណ៌ខ្មៅច្រើនជ្រកពូននៅក្នុងចំការដំណាំមេអំបៅរបស់វាពងដាក់លើស្មៅ ឬដីមុនពេលដាំដំណាំក្រោយពីដំណាំដុះក្នុង ដំណាក់កាលកូនសំណាប វាចាប់ផ្តើមញាស់ ហើយកាត់ស៊ីជាចំណីអាហាររបស់វានៅ ពេលយប់ វាធ្វើឱ្យបាត់បង់ចំនួនដើមច្រើនក្នុងចំការដាំដុះ ។

៤- សត្វទាត្រ: វាជាសត្វល្អិតចង្រៃយ៉ាងខ្លាំងព្រោះ ក្នុង១រដូវវិវឌ្ឍន៍របស់វាចាប់ ពីកូនញាស់ដល់មេចំណាស់ត្រូវស៊ីបំផ្លាញដំណាំជាប្រចាំដូចជា:

- **ដំណាក់កាលកូនញាស់:** មេចំណាស់ពងដាក់លើថ្នាលក្បែរគល់ដំណាំក្រោយពីវាញាស់ទៅជាកូនដង្កូវ តែងតែស៊ីបំផ្លាញឫស នឹងមើមឆែថាវដែលកសិករ យើងហៅថាកណ្តៀវដីស៊ី ធ្វើឱ្យដំណាំស្រពោនបន្ថយការលូតលាស់ដើមត្រូវខូចខាត យ៉ាងខ្លាំង ជាពិសេសនៅរដូវក្តៅ ។

- **ដំណាក់កាលពេញវ័យ:** មេចំណាស់តូចៗ មានស្លាបរឹងប៉ុនៗដើងធ្ងរបស់លក្ខណៈជាក្រុមៗ លោតដោយផ្លាត់ដើររបស់វា សត្វនេះស៊ីទំលុះស្លឹកធ្វើឱ្យស្លឹករ ទុះៗដូចស្បែកស្លឹកក្រិនលែងលូតលាស់ អាចធ្វើឱ្យបាត់បង់ទិន្នផលយ៉ាងច្រើនក្នុង១ឆ្នាំៗ ការបំផ្លាញខ្លាំងចាប់ពី ខែ កុម្ភៈ ដល់ខែ មេសា ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ។ ដើម្បីការពារ នឹងកំចាត់ដង្កូវប្រភេទនេះគេត្រូវអនុវត្តវិធានការយ៉ាងច្រើនដូចជា:

- ការផ្លាស់ប្តូរដីក្រោយពីប្រមូលផលឆែថាវហើយ ត្រូវបាចថ្នាំប្រភេទ Furadan ក្នុងកំរិត ១០-១៥គ.ក្រ /ហា.ត ហើយភ្ជួរលុប ។

របៀបប្រមូលផលគឺដកយកមើមឆែងដាក់តំរៀបនៅនឹងចំការ ក្រោយមក កាត់ស្លឹកចេញហើយជញ្ជូនទៅកាន់ទីត្រជាក់មិនត្រូវដាក់ហាលថ្ងៃឡើយ ។ កាលណាគេបញ្ជូនទៅកាន់ទីផ្សារជិតៗ ត្រូវលាងទឹកសំអាតមើមជាមុន សិន ប៉ុន្តែក្នុងករណី ត្រូវដឹកទៅកាន់តំបន់ឆ្ងាយៗ មិនត្រូវលាងទឹកឡើយ ព្រោះអាចបណ្តាលឱ្យដាំរលាត់ សំបក ទុកមិនបានយូរ ។ ប៉ុន្តែដោយឡែក សំរាប់ការដឹកជញ្ជូន ឬការរក្សាទុកក្នុង ប្រពន្ធបន្ទប់ត្រជាក់គេត្រូវលាង ទឹកសំអាតឱ្យស្អាតជាមុន បន្ទាប់មកដាក់បញ្ចូល ទៅក្នុងកន្ត្រកជ្រាស្លឹកតាម លំដាប់លំដោយកន្ត្រកនោះមានរន្ធអាចជ្រាបចំហាយត្រជាក់ចូលទៅ ក្នុងបានហើយ យកទៅរក្សាទុករយៈពេល ៤០ម៉ោង ហើយបញ្ចុះ សីតុណ្ហភាពឱ្យក្រោមសូន្យអង្សារបួនលេខ (-៥ °C) ដើម្បីសំលាប់ពូកមីក្រូ សរីរាង្គ និងបាក់តេរីផ្សេងៗ ដែលបណ្តាលឱ្យឆាវរលួយ ។ ជាធម្មតា ទិន្នផល ជាមធ្យមទៅតាមប្រភេទពូជនិងរដូវកាលដាំដុះ ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាង ណានៅក្នុង ប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចទទួលបានពី ២៨-៣២ តោន/ហិកតា ។



IV. ការប្រមូលផល

ការប្រមូលផលត្រូវគិតអំពីវដ្តជីវិតរបស់វា ព្រមទាំងតំរូវការទីផ្សារ កាលណា ដកមើមឆែងមិនទាន់គ្រប់អាយុកាល ត្រឹមត្រូវធ្វើឱ្យបាត់បង់ ទិន្នផលព្រមទាំង មិនអាចរក្សាទុកបានយូរផងដែរ ព្រោះវាខ្ចីពេកប៉ុន្តែបើ កាលណាពន្យាពេលដកធ្វើ ឱ្យមើមឆែងចាស់ស្ពោតក៏អាចបាត់បង់ទិន្នផល និងគុណភាពដែរ ។ ដូចនេះដើម្បី ប្រមូលផលទៅតាមស្តង់ដារគឺ គេពិនិត្យ មើលទៅលើពណ៌នៃស្លឹកវាប្រៃពណ៌បៃតង ខ្ចីទៅបៃតងចាស់ កំពូលត្រួយ របស់វាលែងលូតលាស់ដើមប្រៃពណ៌ពីសខ្ចីទៅសប្រផេះ ហើយរលោងគ្មាន ជាប់ឫសពេលដកនោះ ជាដំណាក់កាលត្រូវប្រមូលផល ។

