

គេនិយមដាំពូជឈ្មោះ Rareball ដែលផលិត ដោយក្រុមហ៊ុន Kaneco Seed Company នៃប្រទេសជប៉ុន ។ គ្រាប់ពូជមានភាពល្អិតៗ ទំងន់ ១ក្រាមមាន ចំនួន ២០០-៣០០ គ្រាប់ ដើម្បីដាំ១ហត គេប្រើគ្រាប់ពូជចំនួន៣៥០-៤០០ ក្រាម ។

II. បច្ចេកទេសដាំដុះ

១- ការជ្រើសរើសរដូវ

ការជ្រើសរើសរដូវមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការដាំដុះដំណាំ ។ រដូវ ទាក់ទងនឹង សីតុណ្ហភាព ភ្លៀង សំណើម បរិយាកាស ជំងឺ និង សត្វល្អិត។ ដំណាំស្ពៃក្តោបគេច្រើន តែដាំនៅរដូវត្រជាក់ ។ នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគេអនុវត្តន៍ពីខែតុលា ដល់ខែកុម្ភៈ ចន្លោះពេលនេះគឺសីតុណ្ហភាពត្រជាក់ ពន្លឺថ្ងៃ និង ចំណាំងរបស់ពន្លឺសមស្រប សត្វល្អិត និង ជំងឺមិនមានការរាតត្បាតខ្លាំង។ ចំពោះពូជឈ្មោះ KK Cross មកពីជប៉ុន រដូវនេះសមស្របល្អជាងពូជដទៃទៀត។

២-ការជ្រើសរើស និងរៀបចំដី

ដំណាំស្ពៃក្តោបជាប្រភេទដំណាំមួយត្រូវការដុះលូតលាស់លើប្រភេទដី ធ្ងន់ស្រទាប់ ដាំដុះជ្រៅសំបូរទៅដោយជាតិមមោកព្រមទាំងសំបូរទៅដោយ សារធាតុចិញ្ចឹមផ្សេងៗទៀត ។ ដំណាំនេះគេរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងក្រុមមិនធុនទ្រាំនឹងដី អាស៊ីដគេរៀបចំដីដោយប្រើត្រាក់ទ័រគោយន្ត ឬដោយនង្គ័លគោ មុននឹងភ្ជួរគេ រាស់ទុកដីឱ្យស្ងួតស្រស់ទឹក ហើយប្រមូលយកស្មៅ ឬកាកសំណល់ចេញពីដី ឱ្យស្អាត ទើបគេភ្ជួរលើកដំបូងក្រោយ។

ដំណាំស្ពៃក្តោប

I. ស្ថានភាពទូទៅ

ស្ពៃក្តោបជាដំណាំមួយប្រភេទ ដែល មានប្រភពពីកំណើតមកពីទ្វីប អឺរ៉ុប ។ ជាយូរយារកន្លងមកដំណាំនេះ ត្រូវបាន គេដាំនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបប៉ែក ខាងកើតនិងតំបន់មួយចំនួនក្នុង ទ្វីបអា ហ្វ្រិក ។ ក្រោយមកដោយវិទ្យាសាស្ត្រ បង្កាត់ ពូជជឿនលឿនគេបានបង្កាត់ពូជ តំរូវ ទៅតាមតំបន់ដាំដុះដំណាំប្រភេទ



នេះស្ថិតនៅក្នុងគ្រួសារ Gruciferaeក្នុងអំបូរBrassica Oleracea ។ ស្ពៃក្តោបជា ទូទៅចែកចេញជា ៣ ប្រភេទទៅតាមពណ៌នៃស្លឹក:

- ពូជស្លឹកពណ៌ស្វាយ
- ពូជស្លឹកពណ៌ស
- ពូជស្លឹកពណ៌ក្រហម

ការនិយមដាំនៅប្រទេសកម្ពុជា រៀតណាម ឡាវ ថៃ គឺពូជឈ្មោះ KK Gross ផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Takiiseed Company ។ នៅពេលថ្មីៗនេះនៅប្រទេស ភីលីពីន។



៣-ការបណ្តុះកូន

ដើម្បីធានាឱ្យកូនស្ត្រីក្តោបដុះលូតលាស់ល្អគ្មានជំងឺ និងសត្វល្អិតបំផ្លាញ គេគួរតែជ្រើសរើសកន្លែង សំរាប់សាបកូនដែលមានលក្ខខណ្ឌដូចតទៅ ។ ដី មាន ដីជាតិ នៅក្បែរប្រភពទឹកឃ្នាតឆ្ងាយពីចំការ ស្តែងទៀត វាលស្រឡះមាន ពន្លឺគ្រប់គ្រាន់ ។ គេត្រូវត្រូវ ឬរៀបដីនោះឱ្យផុសល្អរើសយកស្មៅចេញហាល ដី ឱ្យស្ងួត វាយបំបែក ដីឱ្យម៉ត់ល្អ ហើយបាចកំបោរសចំនួន ២៥០ក្រាម លើផ្ទៃដី ២០ម^២ ក្រោយមក លើករងឱ្យបានខ្ពស់គឺទទឹង ១ម បណ្តោយ ១០ម កំពស់ពី ១៥-២០ សម ត្រូវយកដី ១៥.១៥.១៥ ចំនួន ១៥០ ក្រាម ទៅបាចពីលើ ហើយ រាស់លប់ដីនោះឱ្យ។

ពីក្នុងហើយគេត្រូវហាលដីនោះរយៈពេល ២ទៅ៣ថ្ងៃ រាស់បំបែកដីឱ្យល្អិត ទើប ក្នុង ប្រៃដី លើកទី២ ក្រោយពីក្នុងហើយ ត្រូវហាលដីនោះ ឱ្យស្ងួតល្អ ដើម្បីឱ្យស្មៅ ឬ សត្វល្អិតចង្រៃងាប់ ប៉ុន្តែចំពោះដី ដែលកង្វះជាតិកំបោរ គេបាចកំបោរចំនួន ២៥០ ទៅ៣៥០ គ.ក្រ/ហ.ត ហើយរាស់លប់ទៅក្នុងដី។ គេត្រូវនឹងរាស់ចំនួន ២- ៣ លើកឱ្យ បានជ្រៅ និងឱ្យល្អិតធានាឱ្យមានបន្ទុកខ្យល់គ្រប់គ្រាន់ និងឱ្យទឹក ជ្រាបបានល្អរក្សាសំណើមដីបានយូរ។ ជាទូទៅការរៀបចំដីសំរាប់ដំណាំបន្លែ គឺ ដីស្ងួត និងមានប្រភពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីស្រោចស្រព ។



ទាំងយប់ ទាំងថ្ងៃលើកលែងតែពេលភ្លៀង ទើបគ្របគំរូប ការពារពីលើ ។ ក្រោយពី ផ្សាររយៈពេល ១០-១២ថ្ងៃ អាចដាំបាន ។

៤- ការដាំដុះស្ពៃក្តោប

ដើម្បីការដាំដុះដំណាំស្ពៃក្តោបបានល្អ ដំបូងត្រូវលើករងជាមុនសិន។ គេលើក រងឱ្យបានកំពស់ ពី ១៥-២០ស.ម ទទឹង ១០០ស.ម បណ្តោយ ១០-១៥ម ក្នុងករណីដីមានជំរាល គេគួរតែលើករងទទឹងជំរាលរបស់ដីក្រោយមកទៀតគេរាស់ដោយរនាស់ដៃយកស្មៅចេញ និងពង្រាបរងស្មើល្អ ទើបគេកាប់រណ្តៅនៅលើរងជា២ជួរ ចន្លោះ ។



កប់ទៅក្នុងដី (ហាមប្រើដីលាមកសត្វ មិនទាន់ពុក) ក្រោយមកទៀតយកថ្នាំប្រភេទ Furadan ២០ ក្រាម និងប្រភេទថ្នាំផ្សិតឈ្មោះ Mancozeb ឬ Orthocide ចំនួន ១៥ ក្រាម ទៅបាចលើថ្នាលនោះ ទើបគេសាបគ្រាប់ស្ពៃទៅក្នុងថ្នាលដោយប្រើទំងន់ គ្រាប់ចំនួន ៧-១០ក្រាមលើផ្ទៃដី១០ម^២ដើម្បីដាំលើផ្ទៃដី ១ ហា.ត គេត្រូវប្រើគ្រាប់ពូជចំនួន ៣០០-៣៥០ក្រាម ។ ក្រោយពីសាបហើយត្រូវយកកំទេចចំបើងស្លុតកាត់ ឱ្យខ្លីៗបាចពីលើឱ្យក្រាស់ហើយស្រោចឱ្យជោគ ហើយគ្របសំណាញ់ពណ៌ខ្មៅក្រឡាញឹកឱ្យជិត ការពារកុំឱ្យពពួកសត្វល្អិតចូលបំផ្លាញដើម្បីឱ្យកូនស្ពៃដុះល្អគេចាប់ផ្តើមដក ស្មៅនិងដករំលស់កូនស្ពៃចេញឱ្យរង្វើល ក្រោយពីសាបរយៈ ពេល ៨-១០ថ្ងៃ ហើយ ស្រោចបំប៉នដី Urea ៤៦% ដោយប្រើកំរិត ១ស្លាបព្រាបាយ លាយទឹក ២០លីត្រ ឱ្យជោគហើយស្រោចទឹកធម្មតាតាមក្រោយ។ ក្រោយមកទៀតកូនស្ពៃអាយុ ១៨-២០ ថ្ងៃ គេស្រោចដីបំប៉នដោយប្រើប្រភេទ ៤៦% ដដែលកំរិត១ ស្លាបព្រាយ Urea (១០-១៥ក្រាម) លាយទឹក ១៥-២០លីត្រ ស្រោចឱ្យជោគ និងស្រោចទឹកធម្មតា តាមក្រោយ ។ អនុវត្តតាមវិធីនេះរយៈពេល ២៥-២៨ ថ្ងៃ គេអាចដកកូនស្ពៃយកទៅដាំ ប៉ុន្តែមុននឹងយកទៅរយៈពេល ២ថ្ងៃ គេផ្អាកការស្រោចទឹកឱ្យកូនស្ពៃធន់ទ្រាំ និងការកង្វះទឹក និងកំដៅថ្ងៃដល់ពេលរៀបដកត្រូវស្រោចទឹកឱ្យជោគទើបគេដក កូនយកទៅដាំ គឺវាមានសន្លឹក៣-៤ កំពស់ ៨-១០សម។ ចំពោះវិធីផ្សំកូនវិញគេ ដកកូនស្ពៃមានអាយុ ១៤-១៦ថ្ងៃ មានសន្លឹក២ គឺគេផ្សំក្នុងកន្លែង ឬស្បោង ដោយក្នុងនោះមានលាយដីធ្លុះអង្កាម និងដីធម្មជាតិដុសល្អក្រោយពីផ្សំក្នុងកន្លែង ហើយស្រោចទឹកជោគ និងគ្របពេលថ្ងៃ រយៈពេល ២ថ្ងៃ ទើបលែង គ្រប គឺបើកចំហ

ដំណាំអំបូរស្ពៃត្រូវការទឹកជាប្រចាំប៉ុន្តែវាមិនត្រូវការសំណើមដីខ្ពស់ពេកនោះទេ ជាមធ្យមចន្លោះពី ៨០-៨៥% មធ្យមប្រចាំថ្ងៃ ។ គេស្រោចទឹកបានច្រើនវិធី គឺ ស្រោចដោយបោក ព្រឹក និងល្ងាច លើផ្ទៃដី ១៥ម^២ ក្នុង១ ថ្ងៃ ជាមធ្យមពី ៧០-៨០ លីត្រ ។ ចំពោះការស្រោចដោយឧបករណ៍ម៉ាស៊ីនទំនើប ១ ថ្ងៃ គេបាញ់ម្តង ជា ពិសេសនៅពេលល្ងាចជាការល្អ ។ ចំពោះការស្រោចដោយបញ្ចូលផ្ទាល់គេ ធ្វើឡើងលើប្រភេទដីរាបស្មើ និង ដំណាក់កាលស្ពៃក្តោបរួចហើយ។ ដំណាំនេះ ត្រូវការទឹកខ្លាំងក្នុងដំណាក់កាលក្រោយដាំ៤៥-៥០ថ្ងៃ ។

៦-ការជ្រុយដី



ជូរ ៧០សម ឆ្នោះរណ្តៅគឺ ៥០-៦០សម បន្ទាប់មកយកដីគីមីប្រភេទ ១៥.១៥.១៥ ឬ (១៨ . ៤៦ . ០)ចំនួន ២០០គក្រ ដីលាមកសត្វ ឬកំប៉ុស្តិ៍ចំនួន ១៥-២០តោន និង រោយថ្នាំប្រភេទ Furadan ចំនួន ១០ គ.ក្រ ក្នុងផ្ទៃដី ១ហា.ត ហើយជ្រុយលាយ បញ្ចូលគ្នាទើប យកកូនមកដាំ ។ កូនស្ពៃក្តោបមុននឹងយកទៅដាំត្រូវស្រោចទឹក ឱ្យជោគជាមុន ១គម្ព ១ដើម គេដាំនៅពេលថ្ងៃរសៀល ដាំហើយភ្លាមត្រូវស្រោច ទឹកឱ្យជោគ។ គេបន្តការស្រោចទឹកក្នុង១ថ្ងៃ ៣ លើក ព្រឹក ថ្ងៃត្រង់ និងល្ងាចរយៈពេល ២ថ្ងៃ ។

៥-ការស្រោចស្រព



ដំណាំស្ពៃក្តោបត្រូវការជីយ៉ាងខ្លាំងជាងដំណាំស្ពៃឯទៀត ។ ក្នុងដំណាក់កាល នៅតូចវាត្រូវការធាតុអាសូត (N)ច្រើនដើម្បីដុះលូតលាស់ទំហំស្លឹក និងចំនួន ស្លឹកព្រមទាំងពន្លឺតដើមពិសេសគឺដំណាំមានពណ៌បៃតងខ្ចី ។ ចំពោះធាតុ ផូស្វ័រ (P) ដំណាំ ត្រូវការជាបណ្តើរៗចាប់តាំងពីដាំ រហូតដល់ប្រមូលផល គឺធ្វើឱ្យស្លឹក ក្រាស់ ដើមធំ រឹងមាំ ពង្រីកប្រពន្ធិប្រស ឱ្យរឹតតែសកម្មដើម្បីការដឹកជញ្ជូនសារ ធាតុទឹក និងវីដ្យែងៗ ។

- មុនពេលដាំគឺទ្រាប់បាត Basal ជីធម្មជាតិ និង១៥-២៥តោន ជី ១៥.១៥.១៥ ចំនួន ២០០ គ.ក្រ/ហា.ត

- ក្រោយពីដាំរយៈពេល ៥ - ៧ ថ្ងៃ គេស្រោចជីអ៊ុយរ៉េ ៤៦ % ចំនួន ៤០ គក្រ ដោយលាយជាមួយទឹកស្រោចជុំវិញ គល់ហើយស្រោចទឹកលាងតាម ក្រោយជាធម្មតា។



- ក្រោយពេលដាំរយៈពេល ១៨-២០ថ្ងៃ គេប្រើជី ១៥.១៥.១៥ ចំនួន ២០០ គ.ក្រ លាយជាមួយជីអ៊ុយរ៉េ ៤៦% ចំនួន៧០-៨០គក្រ និងជី Potassium ៦០% ចំនួន១០០គក្រ លាយជាមួយគ្នាហើយដាក់នៅតាមចន្លោះគុម្ព នឹងលុបជី ឱ្យជិតហើយស្រោច ទឹកឱ្យជោគ ។

- ក្រោយដាំរយៈពេល ៣០-៣៥ ថ្ងៃ ត្រូវដាក់ជីបំប៉នប្រភេទអ៊ុយរ៉េ ៤៦% ចំនួន ៥០-៦០គក្រ ក្នុង ១ហាត ដោយលាយទឹកស្រោចឬដាក់តាមចន្លោះគុម្ព ក្រោម ស្លឹកស្រោច ឬបញ្ចូលទឹកភ្លៀស ។

- ក្រោយដាំរយៈពេ ៤៥-៥០ ថ្ងៃ ត្រូវដាក់ជីលើកចុងក្រោយ

ការជ្រុំជ្រួយដីពូនគល់ មានគោលបំណងយ៉ាងសំខាន់ គឺ ធ្វើឱ្យដីធូរខ្យល់ ចេញ ចូលព្រមទាំងរក្សាសំណើមបានយូរ ការជ្រាបទឹកបានរហ័សបន្ថយការដុះស្មៅ ។ មុនពេលជ្រុំដីគេត្រូវផ្អាកការស្រោចទឹកចំនួន ១ថ្ងៃមុន ហើយជ្រុំជ្រួយដីឱ្យផុស និងបន្ទាប់មកហាលដីនោះមួយថ្ងៃទៀត ដើម្បីឱ្យស្មៅងាប់ក្រោយមកទើបគេ ស្រោចទឹកអោយជោគខ្លាំង។ ការជ្រុំជ្រួយដីគេធ្វើឡើងជា ២លើក គឺលើកទី ១ ចំនួន ១០-១៥ថ្ងៃ ក្រោយដាំនិងលើកទី២ គឺ ៣៥-៤០ថ្ងៃក្រោយដាំ ក្រោយមក ទៀត គេមិនជ្រុំជ្រួយដីឡើយគឺគ្រាន់តែសំអាតស្មៅប៉ុណ្ណោះការពារការដាច់ឫស របស់ស្ពៃធ្វើឱ្យស្ពៃពន្យារពេលក្តោប ។

៧-ការប្រើប្រាស់ដី





ក្តោបតាមស្រទាប់ៗ ហើយទន់។

- ក្រុមវីរុស ធ្វើឱ្យរុញស្លឹកលែងលូតលាស់ វាបណ្តាលមកពីពួកចៃ រោមបំផ្លាញ ។

២- វិធានការការពារ និងកំចាត់ជំងឺ ជំងឺផ្សិត៖ បន្ថយការស្រោចទឹកនិង ស្រោចទឹកនិងស្រោចដីអាសូត ទុកដីឱ្យស្ងួតដកស្មៅអោយស្អាតបាចកំបោរត្រង់ កន្លែងកើត និងយកថ្នាំផ្សិត ដូចជាOrthocide/ Zineb/ Mancozeb ចំនួន ២០ ក្រាម លាយទឹក ១៥លីត្រ បាញ់ការពារនៅពេលឃើញមានសញ្ញាលើស្លឹកមុន ពេលជំងឺនេះរីករាលដាល។

ដោយប្រើប្រភេទដី ១៥.១៥.១៥ ចំនួន ១០០គ.ក្រ លាយជាមួយដីឆ្កុយរ៉េ ៤៦% ចំនួន ៨០គ.ក្រ និងដីប៉ូតាស្យូមចំនួន ៥០គ.ក្រ ហើយដាក់តាមចន្លោះជួរស្តែ បន្ទាប់មកស្រោចឬ បញ្ចូលទឹកភ្លៀស ។

III. ជំងឺ និងវិធានការការពារ

១-អំពីជំងឺសំខាន់ៗ

- ជំងឺពកឬសៈ ជាទូទៅគេប្រទះឃើញជំងឺនេះតែងតែកើតនៅលើឫសធ្វើ ឱ្យពកនិងរុញ ស្លឹកពណ៌លឿងផ្នែកខាងក្រោម ហើយទុំជ្រុះស្លឹកក្នុងដំណាក់ កាលស្តែក្តោប និងកំពុងក្តោប ជំងឺនេះរីករាលដាលពីដើម១ទៅដើម១ ដោយ សារទឹកយ៉ាងឆាប់រហ័ស វាស្ថិតនៅក្នុងក្រុមជំងឺផ្សិត គេដកដើមនោះចេញហើយ ជ្រំដីហាលឱ្យស្ងួត ត្រង់កន្លែងកើត និងបាចកំបោរទុកចោល ។

- ជំងឺរលួយឫសៈ ធ្វើឱ្យលឿងស្លឹកក្រោយមកដើមទាំងនោះស្រពោន ក្រោយ មកឫសឡើងទន់រលួយប្រៃពណ៌ទៅជាខ្មៅ ស្តែក្តោបមិនអាចលូត លាស់បានឡើយវា បំផ្លាញគ្រប់ដំណាក់កាលលូតលាស់។ក្រៅពីនេះនៅមានជំងឺ ជាច្រើនទៀតនៅក្នុងក្រុម ជំងឺផ្សិតដូចជា Altermaria leaf spot/ Downy Mildew spot, White mold តែងតែ បំផ្លាញគ្រប់ដំណាក់កាលលូតលាស់ ។

- ក្រុមជំងឺបាក់តេរី Bacterial Diseases មានជំងឺ Soft rot, Black rot បណ្តាលមកពីមេរោគ Xanthomonas ភាគច្រើនធ្វើឱ្យរលួយបណ្តាលស្តែ និង រលាកក្នុងរលា

ការប្រើប្រាស់ថ្នាំប្រភេទដូចជា B.T គឺ Bacilus Thuringiensis មាន zondor vita-gro, Dielfin, Bacillus ដោយលាយជាមួយ និងថ្នាំគីមីពុលដូចជា Sumicidine, Sum-ithion, Me ប្រើកំរិត ១,៥ លីត្រ - ២លីត្រ/ហិកតា Viphos Pegasuss Atobron Vertimex ។

២- ដង្កូវហ្វូងឈ្មោះ Spodoptera SP វាតែងតែស៊ីបំផ្លាញដំណាំស្ពៃក្តោប គ្រប់ដំណាក់កាលលូតលាស់ធ្វើឱ្យស្ពៃក្តោបត្រូវខូចខាតទាំងស្រុង ។ លក្ខណៈ



ដំងីបាក់តេរីៈ បន្ថយការស្រោចទឹក ដកដើមកើតដំងីចេញ ប្តូរមុខដំណាំផ្លា ការ ដុះដុតសំលាប់មេរោគដីថ្នាលបណ្តោះ ។

- ក្រុមដំងីវីរុសៈ បាញ់ថ្នាំសំលាប់ពួកចៃ មមាច និង ទ្រីព និងដកដើម ទាំងនោះចោល និង ជ្រើសរើសពូជធន់ ។

IV. អំពីសត្វល្អិតចង្រៃ និង ការការពារ

១- ដង្កូវយោលទោងៈ ដង្កូវប្រភេទនេះតែងតែបំផ្លាញលើប្រភេទដំណាំ អំបូរស្ពៃគ្រប់ប្រភេទវាមានអាយុកាលខ្លីពីពងរហូតដល់មេអំបៅ ចំនួនតែ ១២- ១៦ថ្ងៃ ប៉ុណ្ណោះស៊ីបកជាលិការក្នុងជាតិពីផ្នែកខាងក្រោមធ្វើឱ្យស្ពៃក្តោបលែងដុះ លូតលាស់បាន ។ ដើម្បីការពារដង្កូវប្រភេទនេះគឺគេចាប់ផ្តើមដាំនៅចុងរដូវភ្លៀង ពិសេសពីខែ ១០-១១ ដើម្បីឱ្យស្ពៃក្តោបជាប់ ក្នុងខែ ១២ ជារដូវដែលដង្កូវយោល ទោងបំផ្លាញមិនធ្ងន់ធ្ងរ ។ ម្យ៉ាងទៀតគេសាបកូនស្ពៃនៅក្នុងផ្ទះសំណាញ់ ការពារកូនស្ពៃមិនឱ្យ មានដង្កូវនេះចូលស៊ី ធ្វើឱ្យស្ពៃអាចលូតលាស់លឿន ។ ចំពោះកម្មវិធី IPM គេចិញ្ចឹម សត្វមានប្រយោជន៍ឱ្យតាមកំចាត់ដង្កូវយោលទោង តាមប្រពន្ធិ Biology Cal Control គឺសត្វឈ្មោះ Cotesia Plutellae និង Microplitis Plutellae សត្វឱម៉ាល់ពីរប្រភេទនេះ តែងតែត្រូវការដង្កូវយោលទោង ដើម្បីបង្កើតកូនចៅរបស់វា ។

ការសំអាតស្មៅ ជ្រើសរើសរដូវដាំលាយជាមួយ ដំណាំទៀត ការប្រើ ប្រាស់ពូជធន់ ជាវិធានការដែលអាចជ្រើសយកបាន វិធានការណ៍ ចុងក្រោយគឺ ណែន ។ គេកាត់ដោយរក្សាសន្លឹកខៀវ ពង្សុំជុំវិញក្តោបចំនួន ៣-៤ សន្លឹក ដើម្បី

រក្សាទុកបានយូរ និងធានាការដឹកជញ្ជូនទៅកាន់ទីផ្សាយៗនៅ ប្រទេសកម្ពុជាទិន្នផលមធ្យម ចន្លោះពី ២៥-៣០ តោន/ហិកតា ។



ពិសេសរបស់វាគឺវាញាស់ទាំងហ្វូងៗ ចាប់ពីពេលទៅដល់ មេអំបៅមានអាយុ ៤២ ថ្ងៃ ការ កំចាត់មានប្រសិទ្ធភាពគឺពេលវាទើបញាស់ ។

- ៣- ដង្កូវស៊ីកំពូលស្ពៃឈ្មោះ: Cabbage Webworm វាស៊ីតែកំពូលខ្លីៗ ។
- ៤- សត្វទាត្រូ Striped flea beetle leaf វាស៊ីដោយចាក់ទំលុះស្លឹក ឱ្យធ្លុះ ទុះៗ ពេលវាទើបនឹង ញាស់នៅក្នុងដីកូនដង្កូវរបស់វាតែងស៊ីឫសស្ពៃ ធ្វើឱ្យស្ពៃ ញោម ស្រពោន គេបាចមុនពេលដាំ ឬក្រោយដាំរយៈ ពេលមួយអាទិត្យឈ្មោះថ្នាំ Furadun ៣^H និង ៥^H កំចាត់ដង្កូវរបស់វានៅតូចៗ ។ ក្រៅពីនោះគេបាញ់ថ្នាំដូចជា ដង្កូវយោលទោងដែរតែមិនបាញ់ថ្នាំប្រភេទBTទៅលើដង្កូវ Spodoptera Cabbage Webworm ឬFleabeetleទេ ។

ការកំចាត់តាមវិធីសាស្ត្រ ក្សេត្រសាស្ត្រ អាចជួយឱ្យការដាំដុះលូតលាស់ បានល្អប្រសើរ ។

V. ការប្រមូលផល

ការប្រមូលផល ត្រូវធ្វើឡើងទៅតាមប្រភេទពូជ ពូជធ្ងន់មានអាយុកាល ពី ៩០-១១០ថ្ងៃ ក្រោយដាំពូជកណ្តាលគឺ ៨០-៩០ថ្ងៃ ពូជស្រាលពី ៦៥-៧០ថ្ងៃ ប៉ុន្តែការដាំនៅប្រទេសកម្ពុជា សមស្របគឺពូជ៨០-៩០ថ្ងៃ គឺពូជ KK Cross និង Rareball មុនពេលប្រមូលផលគេផ្អាកការស្រោចទឹករយៈពេល ៥-៧ថ្ងៃ ដើម្បី ស្ពៃក្តោបរឹត ។